

الا بذکرا... نظمن القلوب

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی

سازمان آزمون و برآورده کارشناسی ارشد رشته علوم پزشکی

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

(گروه الف)

تعداد سوالات: ۱۵۰

زمان: ۱۲۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۲۳

مشخصات داوطلب

نام:

نام خانوادگی:

داوطلب عزیز لطفاً قبل از شروع پاسخگویی ، دفترچه سوالات را آن
نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت
وجود هر گونه اشکال به مستولین جلسه اطلاع دهید.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

هر داد ماه ۸۷

دوره های حضوری

موسسه علوم و فنون معین ۰۲۱۸۸۹۱۵۸۴ - www.mui.ir

برگزارکننده دوره های آموزشی امدادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتران تخصصی

جزوه های مکاتبه ای

دفتر مرکزی : تهران بالاتراز میدان ولی‌نصر ، بدار روتخت ، کوی پژوهش پور شماره ۱۲

آزمونهای گذشتی

بارداری و زایمان و بیماریهای زنان

سوال ۱ - کدام موره در خصوص تغییرات لگن در بارداری غلط است؟

(الف) شل شدن مفصل سمعک پوییس در سه ماهه آخر انزایش می‌باید

(ب) یهانی سمعک پوییس پوییس در مولتی پارها انزایش می‌باید

(ج) به هنگام ترم تحرک چشمکیر لگن در اثر حرکت لغزش مفصل ساکروایلیاک روی می‌دهد

(د) قطر خروجی لگن در وضعیت ایقتوسی دور سال به میزان ۲-۳/۵ سانتی متر کاهش می‌باید

سوال ۲ - کدام جمله در خصوص هورمونهای جفتی صحیح است؟

(الف) HCG از نظر ساختهای ما هورمونهای CRH, FSH, LH شباهت دارد

(ب) HPL موجب اندیلین و انزایش میزان اسیدهای چرب آزاد می‌شود

(ج) ایتھیپین موجب آزاد شدن FSH از هیپوفیز می‌شود

(د) CRH چنان موجب کاهش ACTH جفتی می‌گردد

سوال ۳ - با توجه به انتقال ایمونوکلوبولین مادری به جنین، کدام حالت زیر، نوزاد متولد شده از این حیث پرخطر محسوب نمی‌شود؟

(الف) نوزاد با سن حاملکی ۲۵ هفته

(ب) نوزاد Rb⁺ متولد شده از مادر Rb⁻ محسوس شده

(ج) نوزاد دارای مقادیر بالای IgM

(د) نوزاد ۲۸ هفته متولد شده بدنهای ۲۷ ساعت پارگی کیسه آپ

سوال ۴ - عدم تغییر متابولیک، بدلیل بارداری، فیزیولوژیک محسوب می‌شود؟

(الف) کاهش میزان تام کلسیم و میانیم سرم

(ب) احتیاض ۲/۵ اوتر آپ در بدن در عاده ۲۷ هفته

(د) کاهش میزان کلسترول LDL در اولتر حاملکی

(ج) فیدانسولیمی و فیبرکلیسمی ناشی از خلیف

سوال ۵ - کدام بیان در خاتمه باردار ۲۸ هفته طبیعی تلقی می‌گردد؟

(الف) مقادیر بالاتر TSH

(ب) انزایش متاخر ۲ ساعت بعد از خدا

(د) مقادیر بالای یون کلسیم

(ج) کاهش مقدار سرمی ویتامین D3

سوال ۶ - پعنوان ملما کدام مورد را در سه ماهه سوم بارداری به پرتنک متخصص ارجاع می‌دهید؟

(الف) وجود نرخ سوزشی و احساس گزگز در نستها

(ب) احساس ناراحتی در استفاده از لیز تسبیس داخل چشم

(ج) مشاهده نرسیدن و افسردگی سنت�性 در مادر

(د) شکایت عابر از کاهش حافظه ثابت به قل

سوال ۷ - برای تشخیص بارداری، کدام مورد نیازی به تشخیص افتراقی ندارد؟

(الف) تست فرن مثبت

(ب) مشاهده علامت هگار

(ج) وجود ضربان قلب در سونوگرافی

(د) تائید مقادیر HCG در سرم

سال تحصیلی ۸۷-۸۸

رشته مامایی

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

سوال ۸ - کدام مورد جزء غربالگری های روانی - اجتماعی در مادران باردار نیست؟

- (الف) وجود مشکل برای حضور در ویدیوها
 (ب) تغییر مکرر سحل سکونت در پکسال گذشته
 (ج) استفاده از معلایات در ۲ سال گذشته

سوال ۹ - خانم مولتی بار دوم (P2) با شکایت درد شدید در قسمت تحتانی راست شکم در روز اول تبعیک خود مراجعت کرده است. فشارخون ۱۱۰/۶۰ و نیافر ۸۰ است. در معاشره خونریزی اندک مشاهده شده. جرحت سرویکس تردید نیست و درد و حساسیت سمت راست مانع از نسخ توده در اندک است. محتمل ترین تشخیص چیست؟

- (الف) حاملگی زایجا
 (ب) تهدید به سقط
 (ج) مول

سوال ۱۰ - خانم ۴۵ ساله حاملگی سوم (G3) بدون سابقه فشار خون با حاملگی ۱۶ هفته و سابقه لکه بینی به مدت ۷ هفته با خونریزی واژینال و دفع نسخ مراجعت کرده است. ظاهر او آنعبت بوده و نیافر ۹۰ و فشار ۱۳۰/۹۰ دارد. ارتفاع رحم مطابق با سن حاملگی و خونریزی واژینال مشهود است و FHR سمع نمی شود. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

- (الف) مول
 (ب) تهدید به سقط
 (ج) سقط غیرقابل اجتناب

سوال ۱۱ - چه عاملی در میزان الگای تپبروتنین سرم مادر اثر ندارد؟

- (الف) سن مادر
 (ب) فشار خون بالا
 (ج) تعداد جنین

سوال ۱۲ - در اوزیلیهای سلامت جنین کدام مورد غلط است؟

- (الف) تست استرس انتباشت مثبت = وقوع اندت دیررس حداقل در ۵۰-۵۵٪ انتباشت
 (ب) تست بدون استرس طبیعی = حداقل ۲ تحریج در حد ۱۵ ضربه در دقیقه و هر کدام به مدت ۱۵ ثانیه
 (ج) پروتول بیدلیدریکی با اختیار ۱۰ و ملیع کافی = جنین طبیعی و بدون آنکسی
 (د) در بررسی سوتونگراییک ملیع آمیتون وجود شناسن ملیع آمیتونی زیر ۸ سانت = لیکوھیدر آمینوس

سوال ۱۳ - چه اظلاعاتی در طی مانورهای لتوپلد بدست می آید؟

- (الف) پرداختنیون، قرار، پردازش و انگازمان
 (ب) ارتفاع رحم، پوزیشن، چرخش داخلی و لزوی
 (ج) ارتفاع رحم، پوزیشن، انگازمان و حالت

سوال ۱۴ - خانم G2 با حاملگی ۲۸ هفته و ۶ روز با شکایت از دردهای شکمی (حتماً مربوط به شروع زایمان

مراجعةه کرده است. کدام اندام لازم نیست؟

- (الف) بررسی مشخصات انتباشت رحمی و توشه واژینال
 (ب) تجویز تست شمارش حرکات جنین به مدت ۱ ساعت
 (ج) تجویز مسکن به منظور رفع مردها
 (د) پایش الکترونیک خارجی حداقل ۱ ساعت

سوال ۱۵ - در خصوص مراقبت‌های معمول حین تغیر کدام مورد غلط است؟
 (الف) گلوکز، سدیم و آب (سرم) به میزان ۶۰-۱۲۰ میلی لیتر در ساعت.

(ب) خوردن مقابله اندک مایعات ساف شده (بدون نفاه).

(ج) تجویز داروهای از بین برنده یا کاهش معنده در زایمان.

(د) انتخاب پورتیشن و وضعیت بدنش به تنفسه ماند.

سوال ۱۶ - خانم ۳۶ هفته با گستاخشنهای شدید رحمی و مرگ داخل رحمی جنین مراجحة کردۀ است. در معاینه خونریزی واژنمال مشهود نیست و بیلانسیون ۳ تا ۴ سانتی متر می‌باشد. کدامیک از اقدامات زیر اولویت دارد؟

(الف) بررسی فاکتورهای انعقادی و تجویز غراوردهای خونی در صورت لزوم.

(ب) ختم حاملگی به سودت سوزارین اورژانس.

(ج) آکستپشن و ختم حاملگی از طریق زایمان واژنمال.

(د) تحت نظر گرفتن بیمار و دارن قرصت بنایی ختم خود به خودی حاملگی.

سوال ۱۷ - کدامیک از موارد زیر گفتارنیکاسیون نسبی ورزش هوایی در دوران بارداری محسوب می‌شود؟

(الف) BMI بکثر از ۱۶

(ب) هیورتیروالدیسم کنترل شده

(د) دیابت میلتیوس کنترل شده

(ج) آنسی شدید

سوال ۱۸ - در خانم مبتلا به پره اقلامپسی شدید درصورتی که سزاوین اندیکاسیون پیدا نکند کدامیک از روش‌های زیر و مناسب می‌دانید؟

(الف) بس هوشی عروسی

(ب) آنالزی ابیدورال

(د) بلوك ساپ آرکتوئید

سوال ۱۹ - خانم ساعت ۵ بعد از نلیر روز کلشته زایمان طبیعی داشته است از ساعت ۱۲ تیمه شب کلشته دچار تب.

(الف) آنامه شیردهی و یا تخلیه پستان و بزرگی از لحاظ سایر علل تب.

(ب) آنامه شیردهی و یا تخلیه پستان و آنتی بیوتیک تراپی.

(ج) قطع شیردهی و یا عدم تخلیه پستان و بزرگی از لحاظ سایر علل تب.

(د) قطع شیردهی و یا تخلیه پستان و آنتی بیوتیک تراپی

سوال ۲۰ - خانم شکم اول، ۴ ساعت بعد از زایمان طبیعی موقوع به دفع خود به خود اندک شدیده است پس از قرار دادن کالتر ۲۰۰ لدرار دفع شده است کدامیک از اختلالات زیر غیر محتفل می‌باشد؟

(الف) عملکرد نامناسب مثانه

(ب) هماقیوم تاکیه ایورزیاتورهای

(د) احتیاض ادرار پس از زایمان

(ج) نارسایی کلیه

سوال ۲۱ - افزایش فشار خون در کدامیک از عوارض تغییر وضعیت زیر و قوع هیبروتانسیون بارداری را پیشکویی می‌کند؟

(الف) خوابیده به بهنو به خوابیده به پشت

(ب) خوابیده به پشت به خوابیده به بهنو

(ج) نشسته به خوابیده

دورة های حضوري www.mui.ir -۰۲۱۸۸۹۱۵۸۴۰

برگزارشده دوره های آموزشی امدادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتران تخصصی

جزوات مکاتبه ای

آزمونهای کشوری

دفتر مرکزی : تهران بالاتراز میدان ولی‌نصر، بدار روتخت ، کوی پرشک پور شماره ۱۲

سوال ۲۲ - در یک خانم مولوی پار مجار دستورشها در چه صورت لحتمال وجود CPD و توصیه برای سزارین بیشتر است (بر اساس معیار فریدمن)؟

- (الف) سرعت دیلاتاسیون کمتر از ۱/۵ سانتی متر در ساعت (ب) نزول کمتر از ۲ سانتی متر در ساعت
 (ج) توقف تأثیریه دیلاتاسیون بیش از یک ساعت (د) توقف نزول بیش از یک ساعت

سوال ۲۳ - شیوه از بحرانی برای آنکه باید های آنکه (امعمولاً) چه میزان است؟

- (الف) ۸ (ب) ۱/۶ (ج) ۱/۴ (د) ۲/۸

سوال ۲۴ - کدامیک از موارد زیر در مورد انتباختات صحیح است؟

- (الف) سکن است این انتباختات برای رده کوادن عاملگر نایجای شکن مفید باشد.
 (ب) دفعات بروز انتباختات با انتباختات ناشی از مومهای رحمی متفاوت هستند.
 (ج) شدت انتباختات با مسلاه ادن رحم تغییر نمی کند.
 (د) دفعات انتباختات در اوایل مسیع بیشتر است.

سوال ۲۵ - میزان متوسط خونریزی در مورد زایمان سزارین چندین تک قلو چقدر است؟

- (الف) ۵۰۰ میلی متر (ب) ۷۵۰ میلی متر
 (ج) ۱۵۰۰ لیتر

سوال ۲۶ - در کدام مورد ارتفاع رحم بزرگتر از سن حاملکی نیست.

- (الف) چینهای چندقاوی (ب) مثانه ادر
 (ج) چفت سرمهی LMP

سوال ۲۷ - نتیجه اصلی افزایش خطرهای جنینی در حاملکی post term چیست؟

- (الف) نارسائی چفت (ب) فشارهای بینهایت در انر الیگوهدرا آمیتوس
 (ج) کیست های بینهایت و چفت

سوال ۲۸ - معیارهای زیر جهت سندروم ترانسلوزیون کل به کل قبل از تولد صحیح است، بجز:

- (الف) تناول و زدن بیش از ۲۰٪
 (ب) تکاثر میزان هموگلوبین بیش از ۵٪
 (ج) هیدر آمیتوس در کل بزرگتر و الیگوهدرا آمیتوس در کل کوچکتر
 (د) چفت دی کوریوپنیک

سوال ۲۹ - در کدامیک از وضعیت‌های زیر برونده قلبی در زنان حامله بیشتر است؟

- (الف) خوابیده به پهلو (ب) ایستاده
 (ج) خوابیده به پشت

سوال ۳۰ - خلام ۳۶ هفته با محدودیت رشد چدن و اولیکوپیدروآمینوس شدید مراجعه کرده است، در صورتیکه طرح ضربان قلب حبین اطمینان می‌خواهد باشد کدامیک از اندامات زیر را پیشنهاد می‌کنید؟
 (الف) ختم حاملگی از طریق سزاریون
 (ج) خودداری از هرگونه سخت تا اطمینان از بلوغ رسیده
 (ب) ختم حاملگی از طریق زلیمان
 (د) غربالگری از نظر مستدرم TORCH

سوال ۳۱ - در مورد مستدرم AN - HAIR کدام عبارت صحیح است؟

- (الف) هایپرآندروژنیسم - مقاومت به انسولین - GTT مختل
- (ب) هایپرآندروژنیسم - مقاومت به انسولین - آکاتوزنیگریکائس
- (ج) هایپرآندروژنیسم - هیرسوژنیسم - مقاومت به انسولین
- (د) آکاتوزنیگریکائس - عدم تشمک گزاری - هایپرآندروژنیسم

سوال ۳۲ - پس از پیدایش صفات ثانویه چنی کدامیک از موارد از علل نرزسانی تخدان پشمار نمی‌رود؟

- (الف) مستدرم Savage
- (ب) ولسکولیت دیابتی
- (ج) اختلالات خود ایمنی
- (د) عفونتها

سوال ۳۳ - بی اخباری استرس ادرار از عوارض کدام دسته از داروهایست؟

- (الف) لکل
- (ب) آگوئستهای آلتا در درمان سرماخوردگی
- (ج) بتالوکرها در درمان هایپرتانسیون
- (د) بلورکرها کاتال کلریم

سوال ۳۴ - خلاصی که با تاریخی درد شکم حداقل به مدت ۱۲ هفته در ۱۲ ماه گذشته مراجعه نموده که به گفته بیمار با دفع متعدد تسکین می‌بلد و نفعات دفع متعدد وی نیز تغییرپذیر است، تشخیص چیست؟

- (الف) بیوست علنکردی
- (ب) روده تحریک پذیر
- (ج) اسهال علنکردی
- (د) اختلال علکرد آنورکتال

سوال ۳۵ - دختری ۱۲ ساله فاقد صفات ثانویه چنی و عدم متأثر مراجعه نموده تشخیص چیست؟

- (الف) اختلال بلوغ
- (ب) نکامی تا همنمان بلوغ
- (ج) بلوغ هتروسکسوال

سوال ۳۶ - خانمی ۲۸ ساله با شکایت آمنوره ثانویه، صفات ثانویه چنی و یافته های معفته لکنی طبیعی مراجعه نموده، تست حاملگی وی مثبت است و در آزمایشها لنجام شده هیرپرولاکتینی همراه با افزایش TSH مشاهده می شود درمان مناسب چیست؟

- (الف) در مرحله اول درمان هیپوتیروییدی
- (ب) در مرحله اول درمان هیپرپرولاکتینی
- (ج) در مرحله اول درمان هیرپرولاکتینی

سوال ۳۷ - مکانیسم کاهش باروری در آندومتریوز متوسط یا تبدیل چیست؟

- (الف) چسیستنگی در تابعیه تخدانها و لونه های روحی
- (ب) نارسایی مرحله فولیکولار
- (ج) سیکاهای نامنظم قاعده ای
- (د) افزایش میزان E₂ خون در مرحله قبل از تنسک گزاری

سوال ۲۸ - کدام مورد از معیارهای اصلی تشخیص PCOS بشمار می‌رود؟

- (الف) افزایش نسبت LH به FSH - هیبراندروژنی
- (ب) مقاومت به انسولین - عدم ت Hawk گناری
- (ج) عدم ت Hawk گناری مرمن - هیبراندروژنی
- (د) عدم ت Hawk گناری متاورپ - مقاومت به انسولین

سوال ۲۹ - کدام جمله در مورد تریکومونیاز صحیح است؟

- (الف) فقط علوفتهای علامت نار درمان شوند.
- (ب) علوفتهای علامت نار و پدون علامت باید درمان شوند.
- (ج) درمان شرکای جنسی توصیه نمی‌گردد.
- (د) واژینیت علامت دار شیوخ بیشتری ندارد.

سوال ۴۰ - مرحله پلیانی PID، کدامیک از موارد زیر ممکن نیست باشد؟

- (الف) آندومتریت
- (ب) انوسروسیت
- (د) آسه نوله - تخدمانی
- (ج) لکوسیتوز

سوال ۴۱ - کدامیک از موارد زیر در نوجوانان بیشتر مشاهده می‌شود؟

- (الف) آندومتریوز
- (ب) کیست عسلکردی تناسلی
- (د) میومهای رحمی
- (ج) شوپلاسم های بینیم

سوال ۴۲ - کدامیک از حیستهای تخدمانی ممکن است همراه با حاملگی مولار باشد؟

- (الف) نولیکولار
- (ب) جسم زرد
- (د) درموئیدی
- (ج) تکالوتکنی

سوال ۴۳ - موارد زیر در مورد میومهای رحمی صحیح است بجز:

- (الف) از شایعترین تومورهای رحمی هستند.
- (ب) بیشتر آنها بدون علامت هستند.
- (ج) در زنان چاق ممکن است شایعتر باشد.
- (د) از عال مهم تازیمی هستند.

سوال ۴۴ - در مورد خطر ایجاد سرطان میکروسکوپی در پستان مقابل بیمار دارای ملیقه ابتلا به سرطان پستان کدام جمله صحیح است؟

- (الف) حدود ۲۰-۲۵ درصد افزایش احتمال خطر دارد.
- (ب) میزان بروز آن در کارسینومای لوبرلار بیش از داکتل ای است.
- (ج) احتمال افزایش خطری ندارد.
- (د) افزایش احتمال خطر مربوط به سنین ۵-۵۰ سال به بالا است.

سوال ۴۵ - داشتن کدامیک از سرطانها سبب افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان نمی‌شود؟

- (الف) آندرومتر
- (ب) سرویکس
- (د) کولون
- (ج) تخدمان

چین شناسی

سؤال ۴۶- در کدام ناهنجاری، بهلیز و بطن راست شدیداً همپرتووفی شده و قلب چپ رشد نمی‌کند؟

(الف) پسته شدن رودرس سوراخ بینخی

(ب) آذربزی دریچه سلطنتی

(ج) آذربزی دریچه دولتشی

سؤال ۴۷- منتشر چنین قسم است طرفی کدام گزینه زیر است؟

(الف) برجهستگی داخلی بینی

(ب) برجهستگی خارجی بینی

(ج) قلعه مانندیوار

سؤال ۴۸- ترتیح سورفاکتانت از کدام سلولها و در چه زمانی شروع می‌شود؟

(الف) نوموسیت‌های نوع I و II از هفته ۲۲ چنین به بعد (ب) نوموسیت‌های نوع I از هفته ۲۲ چنین به بعد

(ج) نوموسیت‌های نوع II از هفته ۱۸ چنین به بعد (د) نوموسیت‌های نوع II از هفته ۲۲ چنین به بعد

سؤال ۴۹- تمام موارد زیر از مجاری پارامزوتفریک (مونو) بوجود می‌آیند، بجز:

(الف) زانه اپیدیمی (Appendix of testis)

(ب) زانه بیضه (Cervix)

(ج) رحم پروستاتیک (Utriculus prostaticus)

سؤال ۵۰- تمام گروه‌های نوروتی زیر در صفات قاعده‌ای منطقه‌ی میلن سفلان وجود دارند، بجز:

(الف) واپران جاندی (Somatic efferent)

(ب) واپران احتشائی اختصاصی (Special Visceral efferent)

(ج) آوران احتشائی (Visceral Afferent)

(د) واپران احتشائی عمومی (General Visceral efferent)

سؤال ۵۱- منتشر سلول‌های لیدیک کدام است؟

(الف) لپی تایوم سلومیک

(ب) مروکرم احتشائی

(ج) سقیع عصبی

سؤال ۵۲- کدام ناهنجاری زیر سبب بروز پلی هیدر آلفتیوس می‌گردد؟

(الف) فیستول صریع نایین

(ب) آذربزی مردی

(ج) آذربزی کلیه

سؤال ۵۳- حداقل فعالیت جسم زرد در چندین وزر بعد از LMP می‌باشد؟

(الف) ۹

(ب) ۱۲

(ج) ۲۸

(د) ۳۵

سؤال ۵۴- کلاغیک در بروز کلسی فیکاسپون مغزی مخلالت دارد؟

(الف) HIV

(ب) توکسیپیلاسوز

(ج) کوکائین

(د) وارفارین

موسسه علوم و فنون مدنی www.mui.ir-۰۲۱۸۸۹۱۵۸۴۰

برگزارکننده دوره‌های آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتران تخصصی

جزوه‌های مکاتبه‌ای

دفتر مرکزی: تهران، بالاتراز میدان ولی‌نصر، بدار روتخت، کوی پژوهش پور، شماره ۱۲

دوره‌های حضوری

سوال ۵۵ - احتمال اولیه پلاستوپیت به رحم توسط کدام مورد زیر انجام می شود؟

- (ب) Selectin
- (الف) Lectin
- (ج) Fibronectin
- (د) Cachectin

نوزادان و مراقبت های مربوطه

سوال ۵۶ - تست اختصاصی برای تشخیص سیطیلیس نوزادی کدام است؟

- (الف) VDRL خون بند ناف
- (ب) مشاهده اسپیروکتھای متحرک در مایع آمینون
- (د) شواهد سوتونگراییک بزرگ جفت
- (ج) واکنش زنجیره پایمراز مایع آمینون

سوال ۵۷ - احتمال ابتلاء نوزاد پسر به بیماری کمبود G6PD در صورت ابتلاء پدر به بیماری چه میزان است؟

- (ب) ۲۵%
- (الف) ۰%
- (د) ۱۰%
- (ج) ۵%

سوال ۵۸ - نوزادی مدتی پس از زایمان و از بیان سخت بخار مرآمدگی محدود به پارینال راست در ناحیه جمجمه گردیده است که به نظر نمی رسد وشد پیشروعنده داشته باشد. علامت عصبی خاص مشهود نیست کدامیک از توصیه های دلیل را مناسب قریبی دانید؟

- (ب) آسپیرالسیون
- (الف) سل جراحی
- (د) مشکلی وجود ندارد، بهتر است مرخص شود
- (ج) تحت نظر گرفته شود و انجام آزمایشات تکمیلی

سوال ۵۹ - مصرف کدامیک از داروهای زیر در زمان شیردهی معنی است در نوزاد ایجاد استفراغ، اسهال و تنفس کنده؟

- (ب) لیتوبیوم
- (الف) فنوباربیتال
- (د) برمودکربیشین
- (ج) ارگوتامین

سوال ۶۰ - در صورت عدم پاسخ دهنی نوزاد به اقدامات اولیه احیاء پس از چه مدت تلاش، ادامه به تهیه با فشار مثبت می شود؟

- (ب) ۳۰ ثانیه
- (الف) ۱۵ ثانیه
- (ج) ۲۰ ثانیه

سوال ۶۱ - شایع ترین اندیکاسیون برای آمینو سنتز (زنگنه) چیست؟

- (ب) پرتوتاب
- (الف) مصرف دارو در مادر
- (د) سن بالای پدر
- (ج) سن بالای مادر

سوال ۶۲ - مصرف اکسی توسمین در عادر چه تاثیری در جنین دارد؟

- (ب) هیبریطی رویتی
- (الف) هیبوریلی رویتی
- (د) هیبریکسی
- (ج) هیبریکسی

سوال ۶۳ - اتساع شکم نوزاد در بدء تولد نائمه چیست؟

- ب) فتل دیافراگم
- الـ) پارکن مجرای گوارشی
- ج) سپیس
- د) پرینتوپت

سوال ۶۴ - کدامیک از علوفت های زیر از طریق سرو ویکس به جان متنقل می شود؟

- الـ) سرخمه
- ب) اشرشیاکولی
- ج) مالاریا
- د) توکسیپلاسما

سوال ۶۵ - قویت عمل قدرامی کوچک احتمال چه بیماری را مطرح می کند؟

- الـ) هیپروستفالی
- ب) هیپوتیروئیدیسم مادرزادی
- ج) هیپریتروئیدیسم مادرزادی
- د) اکندروبیلاری

سوال ۶۶ - کدامیک از وضعیت های زیر در همراهی با الکوهیدرآمنیوس دیده نمی شود؟

- الـ) تأخیر رشد رحمی
- ب) ارزی کلیه
- ج) آنتیون نوزوم
- د) آمنیون نوزوم

سوال ۶۷ - در ارتباط با منحنی رشد یک نوزاد نول ترم کدام حمله صحیح است؟

- الـ) جله موقع تولد انعکسی از اثر سعیط رحمی دارد.
- ب) در ۲ سالگی با میانگین قد والدین ارتباط ندارد.
- ج) در نوزاد با جله بزرگ و والدین کوچک تا ۱۸ ماهگی به طرف پایین تر منتشر انتقال می یابد.
- د) در نوزاد با جله کوچک پس از ۱۸ ماهگی لغزش به طرف صدک میانگین والدین افزایش می یابد.

سوال ۶۸ - در پایش وشدجهت جلوگیری از اشتهاه در تشخیص اختلال وشد نوزادن ۳۵ هفته متولد شده چه نکته ای را باید در نظر داشت؟

- الـ) افزایش تعداد هفت های نارسی به سن پس از تولد
- ب) کسر تعداد هفت های نارسی از سن پس از تولد
- ج) تفاوتی با سایر نوزادان ندارد.
- د) پایش رشد را از زمان تولد حساب می کنیم.

سوال ۶۹ - نوزادی با ویژگی های زیر متولد شده است: موہای لانگوئی فراوان، آرتوں صاف، لاله گوش نرم با احتقانی مختصر و لاینا میتوهای برجسته، از نظر اجزاء معیارهای عصبی عضلانی Ballard در هر قسم شمره یک می کبرد طبق معیار جدید Ballard حدوداً چند هفت است؟

- الـ) ۲۶ - ۲۲
- ب) ۲۲ - ۲۲
- ج) ۲۰ - ۲۲
- د) ۲۷ - به بالا

سوال ۷۰ - کدام عبارت در خصوص آسیب های جین زایمان بر روی تنخاع و ستون مهره ها صحیح است؟

- الـ) عموماً این ضایعات باعث لنج کامل اندام فوقانی می شود.
- ب) آسیب های وارده به نخاع معمولاً مؤقت است و به طور خودبخودی پهلوود می یابد.
- ج) در شایش سفارلیک بیشترین آسیب در سطح مهره چهارم گرفتی است.
- د) آسیب به ستون فقرات عموماً به دلیل نارسی است تا کشش شدید ستون فقرات.

موسسه علوم و فنون مدنی www.mui.ac.ir - ۰۲۱۸۸۹۱۵۸۴۰

دوره های حضوری

دوره های حضوری

دوره های حضوری

دوره های حضوری

برگزارکننده دوره های آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

جزوه های مکاتبه ای

دفتر مرکزی : تهران - بالاتراز میدان ولی‌نصر، بعداز روتخت ، کوی پرشک پور شماره ۱۲

سؤال ۷۱ - وجود کدامیک از تغییرات پوستی در معلایتات اولیه نوزاد ۳ - ۱ روزه غیر طبیعی تلقی شده و تمیز به برونسی بینشتر دارد؟

- (الف) Mottling به بینال گردیدن
- (ب) رنگ پریدگی
- (ج) آکروسیلورز

سؤال ۷۲ - در برونسی وضعیت یک نوزاد به ظاهر سالم هنگام توجهی از انتقال زایمان یا بستری مجدد انجام کدام معلایته از نظر قلبی ضروری است؟

(الف) انجام ECG برای شمردن قربان قلب و پایش قلب

(ب) برآورد اندیازه قلب و برونسی مسؤول های قلب

(ج) اندیازه گیری فشار خون به روشن اسیلومنتری

(د) گرفتن بینض اندام قوقائی و تحتانی برای برونسی کوارکاتاسیون آنرت

سؤال ۷۳ - مصرف کدامیک از داروهای زیر برای مادر شیرده معنیو است؟

- (الف) خد شنجه
- (ب) سایمیدین
- (ج) مفرونبیازول

سؤال ۷۴ - در حال حاضر کدامیک از غربالگری های هنگام نولد در کلینیک روتین انجام می شود؟

(الف) میلیت ملیتوس

(ب) هیپوئیدروپلیدن

(ج) تالاسمی

سؤال ۷۵ - کدامیک از موارد زیر درباره IUGR صحیح است؟

(الف) با افزایش تولیه انسولین در سطح گیرنده ها عمراء است.

(ب) ممکن است پاسخ طبیعی جثیی به محرومیت اکسیژن باشد.

(ج) در ارتباط با محرومیت غذایی جذبی نفس باشد.

(د) نوع غیر قریب لطف رودتر از نوع قریب آن ایجاد می شود.

بهداشت، تقدیمه مادر و کودک و تنظیم خانواده

سؤال ۷۶ - شاخص توسعه انسانی HDI، یک شاخص مرکب از نشانگرهای در سه بعد، است

(ب) امید به زندگی، میزان با سوادی بزرگسالان، درآمد طول عمر، دانش، درآمد

(ج) امید به زندگی، میزان با سوادی بزرگسالان، GDP

(د) طول عمر، شاخص ناخالص نیتیان مختلط،

سؤال ۷۷ - شاخص کلیت زندگی جسمی یک از نشانگر مرکب از می باشد

(الف) امید به زندگی، میزان درآمد و میزان با سوادی

(ب) مرگ و میر نوزادان، امید به زندگی و میزان درآمد

(ج) مرگ و میر شیرخواران، امید به زندگی در یکسالگی و میزان با سوادی

(د) مرگ و میر شیرخواران، میزان با سوادی و میزان درآمد

- سوال ۷۸ - در شهر X با ۸۰۰۰۰ مورد موالید زنده و ۲۰۰۰۰ مورد موالید مرد در سال ۱۳۸۰، ۲۰۰۰ مورد مرد کوک زیر ۲۸ روز و ۸۰۰ مورد مرد کوک زیر یکسال رخ داده است. IMR شهر X عبارتند از:
- ۵ در هزار
 - ۱۰ در هزار
 - ۲ در هزار
 - ۸ در هزار

سوال ۷۹ - نشانگری که در اندازه‌گیری سلامت مردم مختلف در شرایط مختلف پاسخ پرسان می‌باشد نشانگری است.

- | | |
|--------------|---------------|
| (ب) Reliable | (الف) Valid |
| (د) Specific | (ج) Sensitive |

- سوال ۸۰ - کدامیک از گزینه‌های زیر از عوارض مشترک بین *Anorexia nervosa* و *Bulimia* در مختران نوجوان محسوب می‌شود؟
- ولانگ کردن خود به استفراغ
 - زیاده روی در خوردن غذا
 - چاقی
 - افزونشی

- سوال ۸۱ - حداقل رشد و تغییر شکل و ترکیب بدن در کدام مرحله از بلوغ رخ می‌دهد؟
- | | |
|------------|------------|
| (ب) SMR2-3 | (الف) SMR1 |
| (د) SMR5 | (ج) SMR3-5 |

- سوال ۸۲ - کدامیک از جملات زیر در خصوص کنترل اجابت مراج و ابراز صحیح است؟
- تفاوت‌های فردی و گروهی تاثیری بر زمان کنترل اجابت مراج و ابراز ندارد.
 - توانایی کنترل ادراک در طول روز پس از کنترل منفوع در کوکان اتفاق می‌افتد.
 - خیس کردن رختخواب در مختران تا ۲ سالگی طبیعی است.
 - قطع آموزش توانی و استفاده مجدد از کهنه باعث اختلال در کسب مهارت دفع می‌شود.

- سوال ۸۳ - تفکر سمبیوتی و شکل کپری رفتار هو در چه سنی در کوک اتفاق می‌افتد؟
- | | |
|--------------|----------------|
| (ب) ۱۸ ماهگی | (الف) ۱۲ ماهگی |
| (د) ۲۰ ماهگی | (ج) ۲۵ ماهگی |

- سوال ۸۴ - آموزش همگانی در خصوص منع کوکان از پیش گرفتن شبوه زندگی خطر آفرین جزء کدامیک از سطوح پیشگیری محسوب می‌شود؟
- پیشگیری اولیه
 - پیشگیری پذوی
 - پیشگیری ثانیه

- سوال ۸۵ - شاخمن سولیوان در جامعه ای ۶۵ است. مفهوم آن چیست؟
- ۶۵٪ از افراد جامعه بدون ناتوانی (زندگی می‌کنند)
 - ۷۵٪ از افراد جامعه با ناتوانی (زندگی می‌کنند)
 - مقدار تقریبی سالهایی که صرف ناتوانی در جامعه شده است ۶۵ سال است
 - مقدار تقریبی امید به زندگی بدون ناتوانی ۶۵ سال است.

سؤال ۸۶ - هدف داشتن در زندگی و منعده بودن به چیزی اولی اثر جزء کدامیک از ابعاد سلامتی محسوب می‌شود ؟
 (الف) بعد روانی
 (ب) بعد اجتماعی
 (ج) بعد عالمنی
 (د) بعد روحی

سؤال ۸۷ - اثک برآورده آموزش بوداشت بر پایه نیازهای ملموس جامعه طراحی شود آنکاه کدامیک از اصول آموزش
 بوداشت را رعایت نمودهایم ؟
 (الف) قابل قبول بودن
 (ب) علاوه
 (ج) اشارکت
 (د) ایجاد انگیزه

سؤال ۸۸ - کدامیک از موارد زیر در مورد قرهنهای خوارکن پیشگیری از بارداری صحیح است ؟
 (الف) پرورش تستینها، تولید لکتورهای انعقادی را افزایش می‌دهد.
 (ب) اثر سیگار کشیدن بر ترومبوزریدی در مقایسه با ترومبوز شربیان بیشتر است.
 (ج) همیرتانسیون یک عامل مهم برای ایجاد سکته مغزی در محضر کشتنگان می‌باشد.
 (د) ترومبوز شربیان با دوز پروری مترون بستگی ندارد.

سؤال ۸۹ - پیشترین اثر حلقانگی قرهنهای ترکیبی پیشگیری از بارداری در مقابل سرطان آندومتر در کدامیک از موارد زیر می‌باشد ؟
 (الف) زنان سیگاری
 (ب) زنان دولی بار
 (ج) زنان با سابقه فامیلی
 (د) زنان موافق بار

سؤال ۹۰ - کدامیک از موارد زیر در مورد توبکتومی صحیح است ؟
 (الف) احتمال هیستوتکنومی بعد از توبکتومی کاهش می‌یابد.
 (ب) میزان حاملگی بعدی در روش لکتروکواکولاسیون در کمترین حد است.
 (ج) میزان حاملگی بعدی پستگی به روش توبکتومی ندارد.
 (د) بهترین زمان برای توبکتومی در هنگام سرزارین است.

سؤال ۹۱ - موارد زیر در مورد عمل وازنکتومی صحیح است بجز :
 (الف) با افزایش زمان سپری شده از وازنکتومی، احتمال حاملگی در همسر آنان کاهش می‌یابد.
 (ب) پیشترین نتایج برای برگشت پاروری در افزاد وازنکتومی شده در مدت ۲ سال است.
 (ج) در اکثر موارد در مردان به دنبال وازنکتومی آتش‌بادی شدید اسیدم به وجود می‌آید.
 (د) در مقایسه با توبکتومی با میزان شکست پیشتری همراه است.

سؤال ۹۲ - وجود کدام ماده در رژیم غذایی مانع از چسب روی در کودکان می‌شود ؟
 (الف) کوشت قرمز
 (ب) سبزیجات سبز تیره
 (ج) فیبات
 (د) سیوس غلات

سوال ۹۳ - حادثی نوزاد ۱۰ روزه خود را با وزن هفتکام تولد ۲۲۰ گرم که از تأخیره شکم به پایین زردی واضح دارد به مرکز بهداشتی آورده است. شدت زردی چهلر است. اقدام شما چه می‌باشد؟

(الف) زردی خفیف - شیردهی در بسته بیشتر و مدت ملوانی تر انجام شود

(ب) زردی مدارد - شیردهی را اندامه دعید

(ج) زردی شدید - ارجاع فوری به تزیگتکنون مرکز درمانی

(د) زردی ملوانی مدت - ارجاع به مرکز درمانی

سوال ۹۴ - در معاینه و ارزیابی بالینی کودک ۵/۲ ساله که تأخیر رشد دارد متوجه نقصان کبود و پراکندهای در سطح پشت و شکم می‌شود. مشکل تأخیر رشد در کدام تقسیم بندی قرار دارد؟

(الف) غیر عضوی - مربوط به رابطه کردک - مادر

(ب) عضوی - تغییر متایولیسم مواد غذایی

(ج) غیر عضوی - خانوارگی

(د) عضوی - افزایش انتلال مواد غذایی

سوال ۹۵ - برای کودک ۱۶ ماهه‌ای که ۳ روز قبل پلاسما تزریق شده با چه خاصیت زمانی واکسن پولیو را تجویز می‌نمایید؟

(الف) ۶ ماه بعد از تزریق

(ب) در ثواب بعدی واکسیناسیون

(ج) در زمان سراجمه

(د) ۳ ماه بعد از تزریق

سوال ۹۶ - همه علامت زیر از نشانه‌های کلابت شیرماند در تلفیه انحصاری شیرخوار است. بجز:

(الف) ۶-۸ بار نفع ادرار در ۲۲ ساعت بصورت کمته کاملاً خیس

(ب) خواب یکبار سیک شیرخوار بعد از تخلیه بوستان

(ج) روزانه ۲-۵ بار نفع مدفع و کاملاً آن با افزایش سن

(د) هوشیاری، سلامت ظاهری و شایانی پوست

سوال ۹۷ - کدام ماده موجود در شیر مادر عامل مهار E-Coli در روده کودک است؟

(الف) لاکتوفرین

(ب) ایمونوگلوبولین

(ج) آمیلان

(د) کازنین

سوال ۹۸ - نوزاد مادر HBSAg+ که قبل از تشخیص بیماری مادر تزریق واکسن هپاتیت ب داشته، یاچه خاصیت زمانی بعد از تلقیح، ایمونوگلوبولین باید دریافت نماید؟

(الف) یک ماه

(ب) یک هفت

(ج) نیاز ندارد

موسسه علوم و فنون مدنی www.mui.ir - ۰۲۱۸۸۹۱۵۸۴

برگزارکننده دوره های آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتران تخصصی

دفتر مرکزی: تهران، بالاتراز میدان ولی‌نصر، بعداز روتخت، کوی پرشک پور شماره ۱۲

پیماریهای داخلی جراحی مربوط به عماماییں

سوال ۹۹ - کدام عبارت در مورد کم خوتوی آدیسونین (Addisonian) صحیح است؟

(الف) پیماری خود لیمتری نیست.

(ب) بسیار شایع است.

(ج) در زیر سن ۳۰ سالگی آغاز می شود.

(د) تپاروری یکی از عوارض آن است.

سوال ۱۰۰ - موارد زیر استفاده از تغذیه پارентرال در حاملگی است. بجز:

(الف) انسداد روده

(ب) سوتگی

(ج) اصرع

(د) اوسمنی

سوال ۱۰۱ - کدامیک از موارد زیر جزو عوارض دیالیز در حاملگی نیست؟

(الف) هیپوتانزیون

(ب) سهیمیس

(ج) تارسانی تنفسی

(د) تارسانی غلبی

سوال ۱۰۲ - شایعترین علت انسداد روده در حاملگی کدام است؟

(الف) آهادیسیت

(ب) چسبندگی

(ج) سرطان

(د) ولولوس روده

سوال ۱۰۳ - در کدامیک از حالات زیر نیاز به اسید فولیک افزایش نمی باید؟

(الف) چند قلوئی

(ب) الکلیسم

(ج) پیماری التهابی پوست

(د) پیماری التهابی کبد

سوال ۱۰۴ - بهترین درمان سیپلیکس در زمان حامله ای که به پشت سبلین آرزوی دارد چیست؟

(الف) سلتوراکسون

(ب) اریدرومایسین

(ج) تراسیکلین

(د) حساسیت دلیلی از پترسیلین

سوال ۱۰۵ - کدام علامت جزء تیروئیدیت بعد از زایمان نیست؟

- (الف) اصردگی
- (ب) خواب اویگر
- (ج) اختلال حافظه
- (د) بیوهقی

سوال ۱۰۶ - مصرف بیش از حد استامینوفون در حاملگی سبب چه عارضه‌ای می‌گردد؟

- (الف) نارسائی حاد کبد
- (م) نارسائی حاد کنیه
- (ج) نارسائی حاد ریه
- (د) نارسائی حاد قلب

سوال ۱۰۷ - کدام جمله در مورد پیغاموش در حاملگی صحیح نیست؟

- (الف) ایجاد هیدروکسی مریکن
- (ب) ایجاد لسیوز منکن

ج) اشاره به رانیوگرانی از قفسه سینه دارد.

(د) رانیوگرانی از قفسه سینه به بعد از حاملگی موکول می‌شود.

سوال ۱۰۸ - در خانم مبتلا به آسم، در هنگام تپیروز ایمان کدام مورد غلط است؟

(الف) در آسترنس کورتیکوستروئید به تمام زنانی که در مرض^۴ هفت قل تخت درمان یا استروئید سیستمیک بوده اند تجویز می‌شود.

(ب) کورتیکوستروئید معمول (Mg) ۱۰ هیدروکورتیزون وریدی در ۸ ساعت است.

ج) برای لیدر مهدیین به فناوری ارجحیت دارد.

(د) در زایمان مزارین، آنتیزی هدایش ارجحیت دارد.

سوال ۱۰۹ - در درمان بیابت در بارداری کدامیک از موارد زیر غلط است؟

(الف) برای شروع درمان، دوز کلی ۲۰-۳۰ واحد، یک بار در روز و قبل از صبحانه تجویز می‌شود.

(ب) دوز ثانی معموماً به دو سوم "انسوئین با اثر کوتاه" و یک سوم "انسوئین با اثر متوسط" تقسیم می‌شود.

ج) اندازه گلوبن "بعد از غذا" بر سنجش گلوبن "قبل از غذا" ارجحیت دارد.

(د) انسوئین درمانی در مسونتیکه هیدرگلیسین ناشتا با وجود درمان تقدیمه ای بیشتر از ۱۰/۰ mg باشد، شروع می‌شود.

سوال ۱۱۰ - در زنان مبتلا به هیبرنافسیون مزمن شدید یا پره اکلامپس شدید واکلامپس، کدام مورد زیر غلط است؟

(الف) اختلال اختلال عملکرد کلیوی در ۲۲ ساعت اول زیاد است.

(ب) این زنان دارای حجم خون بیشتری نسبت به زنان باردار طبیعی هستند.

ج) برای تأمین برقورزین باقی ممکن است ترانسفورمیون خون لازم باشد.

(د) موسسه علوم و فنون مدنی www.mui.ir - ۰۲۱۸۸۹۱۵۸۴۰

برگزارکننده دوره های آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتران تخصصی
دفتر مرکزی : تهران بالاتراز میدان ولی‌نصر، بدار روتخت، کوی پرشک پور شماره ۱۲

دوره های حضوری
دوره های آنلاین
جزوات مکاتبه ای
آزمونهای گذشتی