

صبح شنبه
۸۵/۱۲/۱۲

اگر دانشگاه اصلاح شود سلامت اصلاح می شود
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۸۶

مامایی (فقط خواهران)
(کد ۱۴۱۰)

نام و نام خانوادگی داوطلب:	شماره داوطلبی:
تعداد سؤال: ۱۲۰	مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

مواد امتحانی رشته مامایی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	سؤالات امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۲۰	۱	۴۰
۲	بهاره های وراثت و زنان	۲۰	۴۱	۵۰
۳	جنین شناسی	۲۰	۵۱	۷۰
۴	نوزادان و مراقبت های مربوطه	۲۰	۷۱	۹۰
۵	پوشش تغذیه مادر و کودک و تغذیه خانواده	۲۰	۹۱	۱۱۰
۶	بیماری های داخلی و جراحی مربوط به مامایی	۲۰	۱۱۱	۱۳۰

اسفند ماه سال ۱۳۸۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

۱۱- علت چه میزان سقط آبنوزمانی کروموزومی می باشد ؟

۱) ۷۳۰ - ۷۷۰ ۲) ۷۵۰ - ۷۶۰ ۳) ۷۷۰ - ۷۸۰ ۴) ۷۹۰ - ۸۰۰

۱۲- شایع ترین وضعیت کروموزومی در حاملگی دل کدام است

۱) ۶۷ xy ۲) ۶۷ xxx ۳) ۶۷ xx ۴) ۷۷ xxy

۱۳- سطح سرمی مارکرهای زیر در سه ماهه دوم حاملگی با حاملگی جنین با سندروم Down چگونه است ؟

۱) HCG بالا و استریول و AFP ↓ ۲) HCG ↓ و استریول و AFP ↓
۳) HCG ↓ و استریول ↓ و AFP ↑ ۴) HCG ↑ و استریول ↑ و AFP ↑

۱۴- فالوپن از حبه و یا هیچ عوامل توازن در دوران جنینی متعلق به کدام دوران است ؟

۱) پرینود آسپرینک ۲) پرینود قبل از لانه گزینی ۳) پرینود Fetal ۴) ۸ هفته اول بارداری

۱۵- در یوفیزیکال پروفایل برای بررسی سلامت جنین حداکثر پاکت صمدی ۲ سانتی متر باشد سایر معیارها کامل است چه اسکوری به جنین اطلاق می گردد ؟

۱) ۸/۱۰ ۲) ۹/۱۰ ۳) ۱۰/۱۰ ۴) ۷/۸

۱۶- ۳/۴ شدن اپلیکال در نیمه دوم حاملگی چه تئوری می کند ؟

۱) از ۳ به ۵ می رسد ۲) تغییر نمی کند ۳) از ۲ به ۴ می رسد ۴) از ۱ به ۲ می رسد

۱۷- کدام پروسه صحیح در روند زایمانی اتفاق می افتد ؟

- 1) Flexion, descent, external Rotation, internal Rotation, expulsion
- 2) Descent, extension, internal Rotation, external Rotation, expulsion
- 3) Descent, Flexion, internal rotation, expulsion
- 4) Descent, Flexion, external Rotation, extension, expulsion

۱۸- کدام جمله غلط است ؟

- ۱) Beat-to-beat variability: تغییرات بین دو R در کمپلکس QRS قلب جنین است
- ۲) هیپرکسی خفیف جنین باعث کاهش beat-to-beat می شود
- ۳) Long-term variability تغییرات ضربان قلب در یک دقیقه می باشد
- ۴) Beat-to-beat variability در پد از ۳۰ هفته مرتبط با مغالیت جنین

۱۹- درد کثیرا کمپونهای رحمی در Stage یک زایمانی به کدام اعصاب منتقل می شود ؟

۱) T₁₂, T₁₁ ۲) L₁, L₂ ۳) T₉, T₁₀ ۴) اعصاب پروتکتال

۲۰- کدام متکلیف باعث کاهش مایع آمنیوتیک در جنین ایدو متاسین نمی باشد ؟

- ۱) مایع متوسط و به ۲) افزایش مایع توسط ریه ۳) کاهش مایع از پرده ها ۴) کاهش ساعت انقباض در جنین

درس : جنین شناسی

۱- نورون از کجا متولد می گردد ؟

- ۱) اکودرم ۲) مزودرم ۳) اندودرم ۴) مزودرم خارج رونقی

۲- شبکه چشم از کجا متولد می گردد ؟

- ۱) Myelencephalon ۲) Meten Cephalon ۳) Diencephalon ۴) Mesen cephalon

درس : جنین شناسی	رشته : دامپزشکی	صفحه 5
53- نقد عروق از کجا منشأ می گیرند ؟		
(1) مزودوم بیانی	(2) آکتودوم عصبی	(3) آکتودوم سطحی
		(4) شش عصبی
54- آلتولیس در چه روزی ظاهر می شود ؟		
(1) روز هفتم جنینی	(2) روز دهم جنینی	(3) روز دوازدهم جنینی
		(4) روز شانزدهم جنینی
55- جفت از ساختارهای ذیل تشکیل شده است ؟		
		(1) دسیدوا پلاسیس به اتصال کوریون فراتودوم
		(2) دسیدوا پلاسیس به اتصال کوریون فراتودوم
		(3) دسیدوا پلاسیس به اتصال کوریون لور
		(4) دسیدوا پلاسیس به اتصال کوریون لور
56- نقد جملہ از کجا منشأ می گیرند ؟		
(1) آکتودوم	(2) آکتودوم	(3) مزودوم
		(4) مزودوم خارج رویانی
57- کدام مزاتر معمولاً به دیواره خلفی شکم متصل و محدود نمی گردد ؟		
(1) dorsal mesoduodenum	(2) ascending mesocolon	
(3) descending mesocolon	(4) Sigmoid mesocolon	
58- کدام یک از سلولهای ذیل آندروژن تولید می کنند ؟		
(1) سلولهای تک خارجی فولیکول	(2) سلولهای تک داخلی فولیکول	
(3) سلولهای گرتولورا	(4) سلولهای سرتولی	
59- کدام جمله در مورد لقاح صحیح نیست ؟		
(1) سر اسپرم به هنگام ورود به تخمک متراکم می شود		
(2) گریزهای قشری تخمک آزاد می شوند		
(3) دومین تقسیم بر روی تخمک تمام می شود		
(4) تخمک فعال می شود		
60- کدام جمله در مورد توان بانی اسپرم Sperm Capacitation صحیح نیست ؟		
(1) توان بانی اسپرم در داخل دستگاه تناسلی زن اتفاق می افتد		
(2) به هنگام توان بانی اسپرم سر اسپرم متورم می شود		
(3) به هنگام توان بانی اسپرم گلیکوپروتئین قشای اسپرم در ناحیه آکروزوم برداشته می شود		
(4) به هنگام توان بانی اسپرم قشای اسپرم در ناحیه آکروزوم برجی شکل می شود		
61- کدام جمله در مورد زمان تخمک گذاری صحیح نیست ؟		
(1) بالغ آندومتر در لحاظ تکثیر قرار دارد		
(2) سطح LH به صورت ناگهانی افزایش می یابد		
(3) ترشحات آرومی در داخل مایع فولیکولی افزایش می یابد		
(4) غلظت فاکتور پیش برنده بالغ Manuration promoting Factor افزایش می یابد		

درس: جینی شناسی	رشته: دامپزشکی	صفحه: ۶
۷۱- خلط آلفاگلوبولین سرم مادر در کدام پکت از موارد ذیل کاهش می یابد؟		
۱) اندالوسل	۲) تریزومی ۱۸	۳) آگسترونی مثانه
۴) گاستروشیزی		
۷۲- کدام پکت از وریدهای ذیل مستقیماً به شاخه های سینوس وریدی می ریزند؟		
۱) ورید کاردیال قدامی	۲) ورید کاردیال خلفی	۳) ورید زنده ای
۴) ورید ویدی		
۷۳- به کدام شکل گیری دلتیری قلبی سوراخ ثانویه Ostium Secundum در جنین تبدیل می شود؟		
۱) سپتوم اولیه	۲) سپتوم ثانویه	۳) سپتوم اسپایروم
۴) بالشتکهای آندوکاردی		
۷۴- ترحم تلسونون از سلولهای لیدجک در کدام هفته جنینی آغاز می گردد؟		
۱) هفته هشتم	۲) هفته پانزدهم	۳) هفته بیستم
۴) اصولاً ترشیمی در دوران جنینی ندارد		
۷۵- قسمت تحتانی وازن از کجا منشأ می گیرد؟		
۱) مجاری پارامزوتریک	۲) صفحه وازنی	۳) پیازهای سینوسی وازنی
۴) مجاری مزوتریک		
۷۶- کیست جاکلتر Gardner's Cyst از بقایای کدام پکت از عناصر ذیل است؟		
۱) پیازهای سینوسی وازنی	۲) صفحه وازنی	۳) مجاری پارامزوتریک
۴) مجاری مزوتریک		
۷۷- در کلبه دایم کدام پکت از عناصر ذیل از متاتروز منشأ می گیرند؟		
۱) تفرن	۲) مجاری جمع کننده ادرار	۳) لگچه کلبه
۴) اندامی تستهای فوق		
۷۸- نودولاستت پوسیده کدام پکت از سلولهای ذیل ترحم می شود؟		
۱) سلولهای گلبولت مبرای تنفسی	۲) سلولهای مزه در مجرای تنفسی	۳) سلولهای نرغ دوم تنفسی
۴) سلولهای نرغ اول تنفسی		

درس: نوزادان و مراقبتهای مربوطه

۷۹- اختلال کولیت دکرزوان از علل اصلی مرگ و میر حوالی تولد و نوزادی کدام گروه محسوب می شود؟			
۱) بره نرم	۲) جنین	۳) نرم	۴) پست نرم
۸۰- کدام عمومی در کدام پکت از حالات زیر وجود ندارد؟			
۱) هیپروسی	۲) هیپروتنسی	۳) تفرز سادرزادی	۴) استفراغ داود
۸۱- کدام پکت از علائم گلوکوم مادرزادی نمی باشد؟			
۱) قرص بیشتر از یک سانتی متر	۲) لاشک ریزش فعال	۳) متروکرومی عنبیه	۴) قزقرم
۸۲- نوزادی با ضریان قلب بالای ۱۰۰ و تنفسی نامنظم و تون مابجه ای مثل «دون» پاسخ چهره ای به تحریک بینی و کبودی رنگ اندامها در بدو تولد مطابق می کشد آپتار وی چند است؟			
۱) ۳	۲) ۲	۳) ۱	۴) ۵
۸۳- نوزادی بدون اسیدوز با هیوگمی، آپتار کمتر از واقعیت دارد. به کدام دلیل؟			
۱) اسیدوز مادر	۲) مصرف سولفات منیزیم	۳) زایمان آرام و طول کشیده	۴) سطح بالای کاتکول آمین دو جنین

۸۴- کدام پکت از علل آپه نوزادی نمی باشد؟

- ۷۷- خطر بسیاری شلی خیال به کدام دلیل کاهش می یابد ؟
(۱) نوزادان نارس پسر (۲) مصرف کورتیکواستروئید (۳) سزارین (۴) وضع جنین سریع
- ۷۸- هیپوترمی چگونه باعث تشدید HMD می شود ؟
(۱) گسترش آتاکتازی (۲) هیپوتیلایون (۳) تاکی پنه (۴) اسیدوز
- ۷۹- نوزادی قول نرم در پی زایمان وازبال و بدون حادثه دچار تاکی پنه می شود کدام تشخیص احتمال بیشتری دارد ؟
(۱) تاکی پنه گذاری نوزادان (۲) HMD (۳) پانومونی (۴) آپرئیسین مکتوم
- ۸۰- در کپششکالی نوزاد نارس متوالی که در ناپلوی Sepsis فوت نموده است تکرار در بخشی از روده دیده می شود که در ضخامت روده وجود دارد و سوراخ شدگی در روده به چشم می خورده تشخیص شما چیست ؟
(۱) مگاگولون (۲) NEC (۳) TTN (۴) استرونیلور
- ۸۱- در زردی نوزادان کدام علت از عوامل اختلال در فعالیت آنزیم ترانسفراز لیست ؟
(۱) هیپوکسی (۲) هیپوترمی (۳) کم خونی های همولیتیک (۴) کم کاری تیروئید
- ۸۲- از علل زردی نوزادان روز اول نمی باشد ؟
(۱) لوئر ویلاستروژنیک (۲) سندروم کریگلر ناتجار (۳) Sepsis or (۴) سرخچه مادرزادی
- ۸۳- در نوزادان VLBW بیلی روبین در چه حدی می تواند موجب کرن اکتروم بشود ؟
(۱) 16 mg/dl (۲) 25 mg/dl (۳) 30 mg/dl (۴) 10 mg/dl
- ۸۴- نوزادی با هموگلوبین کمتر از ۵۰۰ و لیکنولیت نرمال و تست کومود مثبت دارد . علت آنمی وی چیست ؟
(۱) اختلال هموگلوبین دهنده ناشی از ناسازگاری ABO (۲) آنمی هیپوگلوبینیک مادرزادی (۳) آلفا تالاسمی (۴) کمبود G6PD
- ۸۵- نوزادی به علت وزن کم و تاکی پنه کمتر مدت چهار روز در NICU بستری است روز چهارم متوجه آنمی وی می شود ولی به غیر از Hb پایین بیمار سایر شاخص های هماتولوژیک وی طبیعی است علت چیست ؟
(۱) عفونت (۲) ناسازگاری Rh بین مادر و جنین (۳) اسفروسیتوز (۴) نمونه گیری های تشخیصی زیاد
- ۸۶- در آنمی همولیتیک ناشی از سازگاری Rh بین مادر و جنین از علل عدم در هیدرویس جنینی نمی باشد ؟
(۱) نارسایی طحال و کبد (۲) نارسایی کلیه (۳) DIC (۴) کم خونی شدید
- ۸۷- مصرف کدام داروها دوبار در وقت بروز خونریزی در ۲۴ ساعت اول تولد نوزاد نمی شود ؟
(۱) ویتامین K (۲) فنیلینال (۳) ویتامین (۴) ایزوتیازید
- ۸۸- از شایعترین علل باکتریایی از Sepsis نوزادان حاصل از زایمان طبیعی نمی باشد ؟
(۱) ارگانیسم های روده ای (۲) TB (۳) استرپتوکوک گروه B (۴) گنوکوک
- ۸۹- دوره عفونت های نوزادی با شروع وپروس شامل کدام محدوده سنی است ؟
(۱) تا ۷۲ ساعت اول (۲) هفته اول (۳) روز ۵۷ تا ۳۰ (۴) بعد از روز ۳۰
- ۹۰- از علل اصلی نوزادان در معرض خطر نمی باشد ؟
(۱) فاصله بین بارداری بالای ۵ سال (۲) مادری با کمتر از ۱۶ سال سن

۱۱- بیشترین دلیل معلولیت ها در کودکان زیر ۵ سال در ایران

- (۱) بیماری قلب اطفال (۲) سوتح شنیدگی (۳) سوء تغذیه ها (۴) تصادفات رانندگی

۱۲- حیوان مرگه و میر کودکان ۱-۱۰ ساله در یکته جامعه نشان دهنده شیوع کدام یک از بیماریهای زیر است

- (۱) ژنتیکی و مادرزادی (۲) فقر پروتئین خردی (۳) عفونی و اسهال (۴) راشی تبسم و کم تحرکی

۱۳- ۱-۶۲ عمر جنینی ه نوبت واکنش * که در بافت کرده باشد و بارداری شده باشد کدام یک از توصیه های زیر صحیح است ؟

- (۱) اگر فاصله آخرین دوز گرفته شده بیشتر از ۱۰ سال است باید یک دوز تکرار شود

- (۲) یکته دوز در این بارداری و یکته دوز در بارداری بعدی

- (۳) در این بارداری فقط دو دوز با فاصله ۳ ماه تریق شود

- (۴) فقط واکنش مکرر را یکته دوز قبل از پایان ماه اهرم تزریق کنیم

۱۴- آهن شیر مادر به دلیل تمام عوامل زیر قابلیت دسترسی خوبی برای نوزادان دارد به جز :

- (۱) اسیدی بودن دستگاه گوارش به خاطر لاکتوز بالای آن

- (۲) عمل مناسب لاکتو فرین موجود در شیر مادر

- (۳) کم بودن میزان سدیم در شیر مادر

- (۴) نسبت مناسب روی و مس در آن به نسبت آهن

۱۵- ۱-۹۵ حتی در زمان استفاده از IUD حاملگی اتفاق بیفتد کدام یک از گزینه های زیر صحیح است ؟

- (۱) تولدای نارس ایجاد می شود (۲) مرگ فمیل رسی جنین اتفاق می افتد

- (۳) سقط ناهنگام بوجود می آید (۴) نوزاد SGA موله می شود

۱۶- تمامی گزینه های زیر می تواند اثرات سوء تغذیه های دوران بارداری باشد به جز :

- (۱) Labor بیاثر طولانی (۲) نوزادان LBW (۳) خونریزی های بعد از زایمان (۴) مسمومیت های دوران بارداری

۱۷- تمام توصیه های زیر برای خانم شریحه ای که قرص های پروژسترون دار (Minipill) مصرف می کند درست است به جز :

- (۱) یکته قرص ۲۸ نایی است و ساعت تعیین باید مصرف شود

- (۲) بین هر یکته ۲۸ نایی فقط ۲ روز فاصله باشد

- (۳) از هفته ۶ پس از حاملگی مصرف قرص ها شروع شود

- (۴) حتی اگر حادثه ماهیانه برقرار شود قرص ها اصلا قطع نشود

۱۸- ۱-۹۸ عمر در یکته جلسه بتوانید یک برنامه تنظیم خانواده پیاده کنید اولین قدم کدامیک از گزینه های زیر است :

- (۱) تاریخچه اقدامات و در اختیار مردم قرار می دهید

- (۲) برنامه را اعلام کرده و شروع می کنید

- (۳) با مردم جامعه برنامه را در میان بیگلاریت و نظر خواهی می کنید

- (۴) با دکتر یوسی منطقه برنامه را در میان می گذارید

۱۹- خانم بارداری با وزن ۱۲ کیلوگرم و قد ۱۶۰ در هفته ۱۶ بارداری مراجعه کرده است چه مقدار افزایش وزن تا تولد نوزاد را توصیه می کنید ؟

- (۱) ۸-۶ کیلوگرم (۲) ۱۰-۱۲ کیلوگرم (۳) ۱۰-۸ کیلوگرم (۴) ۱۸-۱۲ کیلوگرم

۱-۱- بهبود تقلید تمام مادران در طول بارداری یک اقدام دو جهت:

۱) یک حفاظت اختصاصی Protection مادر است

۲) توانمند سازی سلامتی Promotion است

۳) یک توان بخشی موثر برای سلامت مادر است

۴) یک برنامه دوماه مناسب برای تولد بچه سالم است

۱-۱-۱ افزایش شاخص PMR رابطه مستقیم با تمام گزینه های زیر دارد به جز:

۱) افزایش میزان مرگ و میر ۲) افزایش تعداد سزارین ها ۳) باروری بدون برنامه ۴) باروری بین ۱۸ تا ۲۵ سال

۱-۱-۲ کارگزاران بهداشتی در سطح اول ارائه خدمات تمام وظایف زیر را دارند به جز:

۱) تهیه لام لازم دو مورد تب های مشکوک ۲) درمان جراحات سطحی و اولی

۳) توزیع پرده ORS برای درمان اسهال ۴) واکسیناسیون کودکان

۱-۱-۳ تمام عوامل زیر جزء ریسک فاکتورهای افزایش سرطان پستان است به جز:

۱) سن بالای ۵۰ سال ۲) استفاده از چربی های بلند زنجیره ای ۳) دیابت غیر وابسته به انسولین ۴) شروع قاعدگی قبل از ۱۲ سالگی

۱-۱-۴ مهترین شاخص خطر برای بقای رنده و تکامل نوزاد کدام یک از گزینه های زیر است:

۱) طول مدت Labor ۲) سن مادر در هنگام زایمان ۳) رتبه تولد نوزاد ۴) وزن نوزاد هنگام تولد

۱-۱-۵ تمام موارد زیر از مشکلات خانواده های دو بهداشت روان دختران نوجوان است به جز:

۱) سوء رفتار عاطفی و جنسی شوهران به زنان

۲) عدم آگاهی خانواده در مورد تغییرات رفتاری دوران بلوغ

۳) ازدواج های تحصیلی در سنین پایین

۴) نگرانی غلط نسبت به مشارکت اجتماعی دختران

۱-۱-۶ تمام اقدامات زیر در برنامه بهداشت باروری وجود دارد به جز:

۱) پیشگیری و درمان ناباروری ۲) مشارکت همه چنانچه مردان

۳) کاهش میزان تجدید تناسل ناخالصی ۴) حفاظت از سوء استفاده جنسی در کودکان

۱-۱-۷ کدام یک از عوامل زیر بیشترین تأثیر را در افزایش یو لاکتین ملار و تولید شیر دارد:

۱) تغذیه خوب مادر ۲) مکیدن کامل نوزاد ۳) پیشگیری از اضطراب مادر ۴) جلوگیری از دوش سزارین

۱-۱-۸ اگر برای پیشگیری از بیماری گزاز بد قلبی مادر را واکسینه کنیم در کدام قسمت از رتبه بندی بیماری های عفونی دخالت کرده ایم:

۱) مصونیت سینه را بالا برده ایم ۲) عامل بیماری را از بین برده ایم

۳) مادران را مطلع کرده ایم ۴) راه انتقال از جفت به جنین را بسته ایم

۱-۱-۹ در زنان حامله استفاده از کدام یک از واکسن های زیر مجاز است:

۱) سرخجه ۲) پولیو خوراکی ۳) هپاتیت B ۴) کزاز و دیفتیری

۱-۱-۱۰ میزان تولد های کمتر از ۲۵۰۰ کیلو گرمی در کشورهای در حال توسعه با تمام عوامل زیر رابطه مستقیم دارد به جز:

۱) عفونت های مادر ۲) باروری پاناسه کم ۳) سوء تغذیه مادر ۴) سیگار و زناه

درس : بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامائی رشته : مامائی

۱۱۱- کدام یک از موارد زیر از جمله عوامل ایولوژیک برای عقب ماندگی شدید ذهنی جنین با کوکس به شمار می رود ؟

- ۱) دیابت مادر ۲) بیماری قلبی عروقی مادر ۳) پره اکلامپسی ۴) هیپرتانسیون مادر

۱۱۲- حلیق درجه بندی پرولا جهت نمودارهای نوولوپلاست جنسیتی درجه ۲ باکتو چیست ؟

- ۱) مناسبت به ویه و یا واژن ۲) یک تا چهار مناسبت

۳) مناسبت به غیر از ریه و سینه شیمی درمانی ۴) پنج تا هشت مناسبت

۱۱۳- همه موارد از عوامل خطر سارنوازی نقص لوله عصبی است به جز :

- ۱) هیپرترمی ۲) دیابت ۳) هیپرگلیسمی ۴) تأخیر نزاد یا نوزاد

۱۱۴- کدام یک از موارد با افزایش شکست MSAFP همراه است

- ۱) لکرونی کبد ۲) مرگ جنین ۳) تریزومی کروموزوم ۴) افزایش وزن مادر

۱۱۵- همه موارد جزو ناهنجاری های مرتبط با سرعت و شلوغی بدن است به جز :

- ۱) نقص لوله عصبی ۲) مایه ترورسیم ۳) نقص قلب مادرزادی ۴) میکرومفالی

۱۱۶- پاتوفیزیولوژی نارسائی آنوت در بارداری چیست ؟

- ۱) هیپرتروپی کانستریک L.V ۲) کاهش پروتئین قلبی ۳) هیپرتانسیون ویدی ۴) هیپرتروپی و دیلاتسیون L.V

۱۱۷- از جمله علل کمپرومیتولیت حاد در بارداری به شمار نمی رود

- ۱) کبکس آبشی ۲) سندرم گودپاسیر ۳) هیپرتانسیون ۴) آندوکاردیت باکتریایی

۱۱۸- کدام یک از ویژگی های کولیت اولیاری است ؟

- ۱) اسهال خونی ۲) گرفتاری قطعه ای روده ۳) استفراغ ۴) کاهش وزن

۱۱۹- خطر کدام یک از عوامل جنینی در مادران چاق به شو بر اثر افزایش می یابد ؟

- ۱) پره ترم ۲) ماکروزومی ۳) نقص لوله عصبی ۴) IUGR

۱۲۰- کدام یک از عوامل هیپرتروپیدی آشکار به شمار نمی رود ؟

- ۱) پره اکلامپسی ۲) آنمی ۳) پلاستارویا ۴) LBW

۱۲۱- دو کدام سن بارداری خطر پرتوهای یونیزان بر ضرب هوشی جنین وجود ندارد

- ۱) هفته ۲۵-۲۶ ۲) هفته ۱۵-۱۸ ۳) بالای هفته ۱۶ و زیر هفته ۲۶ ۴) زیر هفته ۸ و بالای هفته ۲۵

۱۲۲- کدام یک از موارد اندیکسیون مالتیپورینگ همودینامیک ناهنجاری در مادر و دارد ؟

- ۱) کلاس II بیماری قلبی ۲) هیپرتانسیون ویدی ۳) هیپرتانسیون شدید ۴) شوک گلدوا

۱۲۳- از موارد درمان پروپلاسیمی بیماری آمیزشی در قربانیان جنسی به شمار نمی رود ؟

- ۱) کلوتریمازول ۲) آزیترومایسین ۳) سفتریاکسون ۴) مترونیدازول

۱۲۴- دو احیاء قلبی ریوی در بارداری کدام تکنیک اولویت دارد

- ۱) ماساژ خارجی قفسه صدی ۲) تنفس دهان به دهان ۳) جابه جایی نافه رحم ۴) لوله گذاری تراشه

۱۲۵- کدام یک از موارد از شاخص های پائینی بیماری قلبی در بارداری به شمار نمی رود

- ۱) کاهش وزن ۲) کاهش سطح لاکتات ۳) کاهش سطح لاکتات ۴) هیپرتری

۱۲۶- کدام یک از موارد زیر از نشانه های پره اکلامپسی شدید نمی باشد ؟

- (۱) لرزگیوری (۲) افزایش کراتینین سرم (۳) اختلال در رشد جنین (۴) ادم و تر ایزه بدن

۱۲۷- تجویز کدام یک از داروهای ضد فشارخون در حاملگی کنترا اندیکه است

- (۱) نیتراگلیسرین (۲) متیل دوبا Methylidopa (۳) وراپامیل Verapamil (۴) هیدرالازین Hydralazine

۱۲۸- خانم حامله ای که آلفکت باشد و حاملگی بکته آلو باشد روزانه چند میلی گرم آهن نیاز دارد

- (۱) ۳۰ میلی گرم (۲) ۳۰۰ میلی گرم (۳) ۱۵۰ میلی گرم (۴) ۱۰۰ میلی گرم

۱۲۹- شایع ترین علت DIC در حاملگی کدام است ؟

- (۱) جفت سرراهی (۲) مرگ داخل رحمی (۳) چلشدن زودرس جفت (۴) پره اکلامپسی

۱۳۰- کدام یک از داروهای زیر در دوران شیو دهی کنترا اندیکه بدون دارد

- (۱) دیگوکسین (۲) منادین (۳) متیل دوبا (۴) کلرپریدازول