

صبح شنبه
۸۷/۱/۱۳

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور



آزمون ورودی
دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل
سال ۱۳۸۸

مأمایی
(کد ۱۴۱۰)

نام و نام خانوادگی داوطلب:	شماره داوطلب:
تعداد سؤال: ۱۲۰	مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از هر سؤال	تا شماره
۱-	زبان انگلیسی	۲۰-	۱	۴۰-
۲-	بیولوژی، زیست‌شناسی و بیماری‌های زنان	۲۵-	۳۱	۵۵-
۳-	جایگاه‌شناسی	۱۵	۵۲	۷۰-
۴-	تولید و مراقبت‌های مربوطه	۱۵	۷۱	۸۵-
۵-	بیودیتکت، نظریه عام و کودکان و تنظیم خانواده	۱۵	۸۲	۱۰۰-
۶-	بیماری‌های زنان و بیماری‌های مربوط به مائوئری	۲۰	۱۰۱	۱۲۰-

پنجم ماه سال ۱۳۸۷

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

۷۲۱

۷۲۱

✓ دوره‌های حضوری
✓ جزوات مکانیه ای
✓ آزمونهای کشوری

موسسه علوم و فنون معین ۰۲۱۸۸۹۱۵۸۴۰- www.mui.ir
برگزارکننده دوره‌های آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
دفتر مرکزی: تهران، بالاتر از میدان ولیعصر، بعد از زرتشت، کوی پزشک پور، شماره ۱۲

۳۱- خالهی یا شکایت از نشت ادرار غیر ارادی همراه با احساس فوریت مراجعه کرده است بی اختیاری او از چه نوع است؟

urge incontinance (۱)

stress incontinance (۲)

mixed urinary incontinance (۳)

frequency (۴)

۳۲- در درمان هیپرپلازی آندومتر از پس از رد کردن کارسینومای آندومتر در بیماران علامت دار در صورت تمایل به حفظ رحم پس از درمان با عدروسی پروژسترون استات طولی الاثر و تکرار بیوپسی در صورت طبیعی یا آتروفیک بودن آندومتر کدام بعدی شامل همه موارد است بجز؟

(۱) القای تخمک گذاری در صورت تمایل به بچه دار شدن

(۲) تجویز دوز بالای MPA طولی الاثر بمدت سه ماه

(۳) انجام بیوپسی سالیانه آندومتر

(۴) ادامه MPA طولی الاثر ۱۰ روز در ماه بمدت ۱۲ ماه

۳۳- در ارتباط با اختلالات تخمدان در صورت وجود نشانه و علامت هیپر آندروژنیسم، الیگومنوره، یا عدم تخمک گذاری و رد تصویب سایر علل تشخیص احتمالی چیست؟

(۱) اختلالات ژنتیکی XO

(۲) PCOD

(۳) کاهش ذخایر تخمدان

۳۴- داروهای ذیل منجر به اختلال نموده می شود مگر؟

(۱) متوکلوپرامید

(۲) دیورتیک های نیازیدی

(۳) داروی ساینیدین

۳۵- اصطلاح آسترواسیرمی به کدام مورد گفته می شود؟

(۱) غیر طبیعی بودن تمام پارامترهای اسیرموگرام

(۲) کاهش تحرک اسیرم

(۳) افزایش اشکال غیر طبیعی اسیرم

۳۶- در خصوصی منوپوز کدام جمله صحیح نیست؟

(۱) استروژن غالب دوران پائینی استرومن می باشد

(۲) علت افزایش FSH کاهش ترشح inhibin تخمدان می باشد

(۳) میزان FSH ۲ ماهه سال پس از منوپوز ادامه دارد و سپس پایین می آید

(۴) افزایش LH یوده تر از افزایش FSH اتفاق می افتد

۳۷- فصلیت کدامیک از عوامل زیر در بروز کانسرویکس ایات شده است؟

(۱) سیگار

(۲) O.C.P

(۳) HPV

(۴) HSV

۳۸- جهت غربالگری تومورهای تخمدان کدام روش توصیه می شود؟

(۱) سونوگرافی ابدومینال با ایلر

(۲) سونوگرافی ابدومینال با ایلر

(۳) پاپ اسمیر

(۴) سونوگرافی و ترانزال

۳۹- شایع ترین علامت کانسر آندومتر کدام است؟

(۱) یبوست

(۲) خونریزی غیر طبیعی راسی

(۳) بزرگ شدن شکم

۴۰- شایع ترین علامت بدخیمی درماموگرافی کدام است؟

(۱) توده با حدود نامنظم

(۲) میکرو کلسیفیکاسیون های چتر ضعیف

(۳) توده با حدود منظم

۴۱- در هنگام بیوشی عمومی در سزارین همه موارد زیر را باید در نظر داشت مگر؟

(۱) داروهای آستروژنیک و آلتروژنیک از جفت عبور کرده و به جفت منتقل می گردد

(۲) جفت اسیدینه پایین عمده خشم های حامله آسیراسیون احتمالی خطرات بیشتری همراه دارد

(۳) جفت ظرفیت پایین هوای تنفس میزان نیاز به گازهای بیوشی افزایش می یابد

(۴) زمان تجویز نوار آستروژنیک ۳۰ لوله گذری باعث کاهش حجم هوای ذخیره ای ریه باید کم باشد

✓ دوره های حضوری

✓ جزوات مکانی ای

✓ آزمونهای کشوری

موسسه علوم و فنون معین ۰۲۱۸۸۹۱۵۸۴۰- www.mui.ir

برگزارکننده دوره های آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

دفتر مرکزی: تهران، بالاتر از میدان ولیمصر، بعد از زرتشت، کوی پزشک پور، شماره ۱۲

۲۲- در تشخیص IUGR کدام معیار دقیق‌تر است؟

۱) معایب رشد جنین بر حسب پرستاری وزن جنین در بومعه
۲) معایب رشد جنین بر اساس اندازه گیری وزن جنین

۳) معایب رشد جنین بر اساس اندازه گیری است وزن جنین به وزن مادر

۲۳- خانم حمله‌ای با سببه تولد یکتا نوزاد IUGR که بعداً دچار علائم CP شده است هم اکنون با بارداری ۳ ماهه مراجعه کرده

است در بررسی افزایش مقاومت عروقی رحمی در سونوگرافی داپلر ششایی شده است اقدام درمانی کدام است؟

۱) پیگیری دقیق دوران پرمانتال و تجویز هپارین روزانه

۲) پیگیری دقیق دوران پرمانتال و توجه به استراحت و تغذیه مناسب

۳) پیگیری دقیق دوران پرمانتال و تجویز اسید فولیک با دوز بالای روزانه

۴) پیگیری دقیق دوران پرمانتال و تجویز آمپورین روزانه

۲۴- در مانیفست کستر کمپون‌های رحمی خانم باردار انقباض ثبت شده ۱۸ mmHg فشار دارد، کدام جمله صحیح است؟

۱) بیمار در مرحله دوم فاز فعال زایمان است

۲) انقباضات پراکتون هیکس می‌تواند باشد

۳) بیمار در مرحله اول فاز فعال زایمان است

۴) بیمار در Latent فاز نیست

۲۵- شایع‌ترین آنومالی دیده شده در سونوگرافی در سه ماهه اول بارداری کدام است؟

۱) آنومالی‌های CNS ۲) آنومالی‌های قلبی ۳) امفالوسل ۴) آنومالی اسکلتی

۲۶- در اندازه گیری NT با سونوگرافی در بارداری کدام جمله صحیح نیست؟

۱) سونوگرافی وازیتال نیست به آبدومیتال ارزش تشخیص بالاتری دارد

۲) مهم‌ترین نشانه تشخیص آنومالی‌های کروموزومی در سه ماهه اول بارداری می‌باشد

۳) اندازه آن ارتباط مستقیم با اندازه CRL دارد

۴) مقادیر بالاتر از ۳mm نشانه آنومالی کروموزومی است

۲۷- شایع‌ترین علت NT غیر طبیعی در سولو چیست؟

۱) تریزومی ۱۵ ۲) تریزومی ۱۳ ۳) سندرم Down ۴) آنومالی‌های قلبی

۲۸- بهترین روش غربالگری سندرم Down در بارداری کدام است؟

۱) NT سه ماهه اول و انجام تریبل تست ترائیل سه ماهه دوم ۲) NT سه ماهه اول و انجام تریبل تست ترائیل است سه ماهه اول

۳) بررسی نوکال فولد سه ماهه دوم و تریبل تست ترائیل سه ماهه دوم ۴) بررسی نوکال فولد سه ماهه دوم و تریبل تست ترائیل است سه ماهه اول

۲۹- پدیده Redistribution در جنین در اثر چه عاملی ایجاد می‌شود؟

۱) نارسایی قلبی جنین ۲) هیپوکسی جنین

۳) افزایش مقاومت جریان خون شریانی مغزی میانی ۴) افزایش after load تست چپ قلب

۵۰- در اوزنایی ولوزیته عروقی جنینی برای بررسی هیپوکسی جنینی بکارگیری کدام عروق معتبرتر است؟

۱) ورید ناف ۲) وناکبر ۳) وناکوس ونوزوس ۴) شریان مغزی میانی

۵۱- در خانم حمله‌ای در آزمایش انداز سه ماهه اول بارداری پروتئین trace گزارش شده است کدامیک از جملات زیر صحیح

نیست؟

۱) میزان پروتئین ادرار بالاتر از $\frac{3 \cdot \text{mg}}{100 \cdot \text{cc}}$ است و کنترل منفکی توصیه می‌شود

۲) بکت پلازی (+) محسوب شده و بیمار باید دقیقاً تحت نظر باشد

۳) میزان پروتئین ادرار کمتر از $\frac{3 \cdot \text{mg}}{100 \cdot \text{cc}}$ ادرار است و اقدام خاصی نیاز نیست

۴) میزان پروتئین ادرار کمتر از $\frac{2 \cdot \text{mg}}{100 \cdot \text{cc}}$ ادرار است ولی بیمار باید تحت کنترل باشد

✓ دوره های حضوری

✓ جزوات مکانته ای

✓ آزمونهای کشوری

موسسه علوم و فنون معین ۰۲۱۸۸۹۱۵۸۴۰ www.mui.ir

برگزارکننده دوره های آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

دفتر مرکزی: تهران، بالاتر از میدان ولیمصر، بعد از ارتشت، کوی پزشک پور، شماره ۱۲

۵۲- کدامیک از تغییرات زیر در بیماران پره اکلامپتیک دیده نمی شود؟

- (۱) میزان NO افزایش می یابد
(۲) میزان MDA افزایش می یابد
(۳) تعداد پلاکت ها خون افزایش می یابد
(۴) میزان تری گلیسرید افزایش می یابد

۵۳- چند درصد والدین با سقط های مکرر یک اینورمالیتی کروموزومی بالایی شده دارند؟

- (۱) ۱۵٪
(۲) ۲۵٪
(۳) ۳۵٪
(۴) ۴۵٪

۵۴- کدامیک از عوامل زیر نمی تواند عامل سقط مکرر باشد؟

- (۱) CMV
(۲) سندرم آنتی فسفولیپید
(۳) بیماری های ترومبوفیلیک ارثی
(۴) بیماری های ترومبوفیلیک اکتسابی

۵۵- برای بررسی سن جنین ۱۶ هفته کدام روش ارزش کمتری دارد؟

- (۱) اندازه گیری C.R.L.
(۲) اندازه گیری G.S
(۳) اندازه گیری طول قنور
(۴) اندازه گیری BPD

درس: (جنین شناسی)

۵۶- کدامیک از گزینه های زیر در طی مرحله دوم تقسیم میوز اتفاق می افتد؟

- (۱) شکسته شدن سانترومر
(۲) مفاصل شدن DNA
(۳) جدا شدن کروموزوم های همولوگ
(۴) کرانینگ اور

۵۷- تمام موارد زیر در مورد مول هیداتی فورم صحیح است بجز؟

- (۱) تروم تمام سلول های آن پدری است
(۲) میزان ترشح hCG بیشتر از حد طبیعی است
(۳) پرده های جنینی در مول تا حدودی تشکیل می شوند
(۴) تعداد کروموزوم ها در سلول های مول معمولاً ۲۳ کروموزوم می باشد

۵۸- تمام وقایع زیر تا هفته چهارم جنینی اتفاق می افتد بجز؟

- (۱) پیشانی اولین جفت سومینا
(۲) باز شدن لثه دهانی حلقی
(۳) بسته شدن نوروپورها
(۴) شروع قش فیزیولوژیک

۵۹- کدام گزینه موجب ترالوما می شود؟

- (۱) باقی ماندن شیار اولیه
(۲) باقی ماندن نوتوگورده
(۳) گاسترولاسیون غلط
(۴) باقی ماندن مجرای آمیون و کیسه زرده

۶۰- نشاء جفتی در کجا تشکیل می شود؟

- (۱) ویلوزیته اصلی
(۲) ویلوزیته میانی
(۳) ویلوزیته انتهایی
(۴) صفحه کوریونی

۶۱- در پایان هفته سوم کدامیک از لایه های زیر باعث اتصال محکم کیسه کوریون به آندومتر می شود؟

- (۱) مزودرم مزوایپلوریوتیک
(۲) مزودرم مزوایپلوریوتیک
(۳) مزودرم اپیلاکتیپلوریوتیک
(۴) میسیو تروفوبلاست

۶۲- تمام موارد زیر در مورد پره اکلامپسی صحیح است بجز؟

- (۱) یک نوع اختلال تروفوبلاستی می باشد
(۲) می تواند باعث مرگ مادر، جنین و یا عقب ماندگی رشد گردد
(۳) در زنان سیگاری بیشتر دیده می شود
(۴) معمولاً تا هفته ۲۰ (ایمان دوره) بطور ناگهانی در مادر بروز می کند

✓ دوره های حضوری

✓ جزوات مکانیته ای

✓ آزمونهای کشوری

موسسه علوم و فنون معین ۰۲۱۸۸۹۱۵۸۴۰- www.mui.ir

برگزارکننده دوره های آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

دفتر مرکزی: تهران، بالاتر از میدان ولیمصر، بعد از ازشت، کوی پزشک پور، شماره ۱۲

۶۳- اگر در دوقلوها کیسه آمیون و کوریون مشترک باشد کدام گزینه صحیح است؟ (زمان ها بر اساس زمان تقاض می باشند)

- (۱) جنینی در توده مغولهای داخلی در روز ۴-۶
(۲) جنینی از مغولها جدا بلافاصله پس از تشکیل بلاستوسیت
(۳) جنینی بلاستومرها قبل از روز سوم
(۴) جنینی دایسک جنینی در هفته دوم

۶۴- ناحیه قدامی Cardogenic area به کدامیک از عناصر زیر تبدیل می شود؟

- (۱) اولین somitic arch (۲) لوله های قلبی
(۳) آئورت پیشی (۴) ورید اجوف فوقانی

۶۵- شایع ترین ناهنجاری مادرزادی قلب کدامیک می باشد؟

- (۱) نقص دیواره بین دو دهلیز (ASD)
(۲) نقص دیواره بین دو بطن (VSD)
(۳) تترالژی فالوت (Tetralogy Fallot)
(۴) کوآرکتاسیون آئورت (Coarctation of Aorta)

۶۶- پوشش داخلی کدامیک از ارگانهای زیر غشاء مزودرمی دارد؟

- (۱) پروستات (prostate)
(۲) کیسه منی (seminal vesicle)
(۳) غده کوبر (cooper)
(۴) غده لیتز (Littre)

۶۷- تمام عناصر ذیل از طبقه عرضی منشا می گیرند بجز؟

- (۱) منتهای دیافراگم
(۲) منطبق اندومی دیافراگم
(۳) فیروز پرکتا در جرم
(۴) منطبق استرومای کید

۶۸- انتهای تحتانی وازن از کجا منشا می گیرد؟

- (۱) مجرای پارامزوفریک
(۲) مجرای مزوفریک
(۳) سینوئیدال ولب
(۴) ناحیه لگنی سینوس اوروژینال

۶۹- نقص در Spiral aortic- pulmonary septum باعث تمام ناهنجاری های زیر می شود بجز؟

- (۱) نقص تیغه بین بطنی
(۲) جابجایی عروق بزرگ
(۳) نقص تیغه های بین دهلیزی
(۴) پایداری ته شریانی (transcous arteriosus)

۷۰- کدام جمله در مورد مغول های مینیتور و فلوپلاست صحیح است؟

- (۱) غشاء پلاسمایی آنها کاملاً مشخص است
(۲) خاصیت نواحی کمی دارند
(۳) از مغول های مینیتور و فلوپلاست منشا می گیرند
(۴) از توده داخلی منشا می گیرند

درس: (لوزادان و مراقبتهای مربوطه)

۷۱- فونتال باز در کدامیک از اختلالات زیر دیده نمی شود؟

- (۱) هیدروسفالی (۲) خیرسفتالی
(۳) هیپروولیدی (۴) پرده حاجره ای

۷۲- در کدامیک از موارد زیر علی رغم وجود اسیدوز آپگار کودک نرمال است؟

- (۱) تجویز سولفات منیزیم (۲) آنژی کرفال
(۳) اسیدوز مادر (۴) هرنی دیافراگمی

۷۳- در یک نوزاد یک روزه که پس از اولین تغذیه با شیر مادر دچار استفراغ شده و از دهان وی بصورت مداوم بزاق جاری می شود. برای تشخیص اقدام به عبور دادن کاتتر به داخل معده شد ولی کاتتر عبور نکرد. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

- (۱) انسداد دئودنوم (۲) ناستریتی پیلور
(۳) افزایش فشار داخل جعبه (۴) آنژی نری
۷۴- در یک نوزاد ۱۱ روزه که برای اولین بار دچار زردی شده است. کدام یک از موارد زیر جزء تشخیصهای افتراقی نیست؟

- (۱) پرکان شیر مادر (۲) زردی فزونیوزیک
(۳) سببی سمی (۴) هیپوتیروئیدی

✓ دوره های حضوری

✓ جزوات مکانی ای

✓ آزمونهای کشوری

موسسه علوم و فنون معین ۰۲۱۸۸۹۱۵۸۴۰- www.mui.ir

برگزارکننده دوره های آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

دفتر مرکزی: تهران، بالاتر از میدان ولیمصر، بعد از ارتشت، کوی پزشک پور، شماره ۱۲

- ۷۵- کدر بودن سطح جنینی جفت نشانه‌ای از کدام اختلال است؟
 (۱) دفع مکرر (۲) استرس (۳) عفونت (۴) نارمی
- ۷۶- کدامیک از تستهای زیر برای همه نوزادان (زیر ۲۵۰۰g) قبل از ترخیص باید انجام شود؟
 (۱) تست شنوایی (۲) هموگلوبین (۳) چک فشار خون (۴) معاینه رتین
- ۷۷- کدامیک از علائم زیر در بیمار مبتلا به فستول تراشه به مری (TEF) دیده نمی‌شود؟
 (۱) ترشح مژگان بزاق (۲) استراخ صفراوی (۳) پلی هیدر آمیوس (۴) پانکراتی آسیراسیون
- ۷۸- مصرف کدامیک از داروهای زیر توسط مادر، احتمال خونی‌ریزی درون جمجمه‌ای را در نوزاد افزایش می‌دهد؟
 (۱) هارین (۲) کاربامازپین (۳) والپروئیک اسید (۴) فنی توئین
- ۷۹- کدام یک از موارد زیر جزو ویژگی‌های بالینی کریکتروس فورم حاد در فاز سوم (بعد از هفته اول) می‌باشد؟
 (۱) رفلکسهای تونیک‌هایاری (۲) هیپوتونی (۳) میو تونی (۴) انحراف دید به بالا
- ۸۰- کدام یک از موارد زیر محتمل‌ترین علت خونریزی از محل ختنه در یک نوزاد ۳ روزه که روز گذشته ختنه شده است می‌باشد؟
 (۱) کسید ویتامین K (۲) مصرف فنوبیتال توسط مادر (۳) کواگولوپاتی ارثی
- ۸۱- در یک نوزاد ۵ روزه مبتلا به تتانی که به درمان با کلیم پاسخ نپسیده به کدام اختلال متابولیکی مشکوک می‌شود؟
 (۱) هیپر فسفاتمی (۲) امپرمینمی (۳) هیر کلسمی (۴) هیپومینرمی
- ۸۲- نحوه اندازه گیری قند خون نوزادان بدون علامت متولد شده از مادران دیابتی چگونه است؟
 (۱) اندازه گیری قند خون طی ۲ ساعت پس از تولد و سپس در روز دوم تولد.
 (۲) اندازه گیری قند خون طی یک ساعت پس از تولد و هر ساعت تا ۸ ساعت پس از تولد.
 (۳) اندازه گیری قند خون در ۸ ساعت اول پس از تولد و سپس در روز دوم تولد.
 (۴) اندازه گیری قند خون هر ۲۴ ساعت یکبار تا ۳ روز
- ۸۳- پاندهای آمینولیک و ناهنجاری‌های ناشی از آن مثل آمبولاسیون یک اندام، جزو کدام گروه از نقایس اولیه نمرعی باشند؟
 (۱) نامنظمی (مالتورماتسیون) (۲) فروپاشی (disruption) (۳) دیسپلازی (۴) دیورماتسیون
- ۸۴- کدام یک از موارد زیر جزو علل تب در یک نوزاد ۲ روزه نمی‌باشد؟
 (۱) دمبراتسیون (۲) عفونت (۳) میو تروپیکسم (۴) هیپرتروپیکسم
- ۸۵- در معاینه شکمی یک نوزاد تازه متولد شده، بیرون زدگی قسمتی از محتویات شکم بداخل پایه پندناف که با پروتئوم بدون پوست پوشانده شده است، مشاهده شده است. تشخیص کدام است؟
 (۱) فتق نافی مادر زادی (۲) بازماندن مجرای امفالومزانتیک (۳) امفالومیل مادرزادی (۴) انتروترانومای ناف

درس: (تغذیه مادر و کودک و تغذیه خانواده)

۸۶- حاملگی و زایمان از دیدگاه برنامه جامع Safe mother hood

(۱) یک سته صرفاً بولوریک است

(۲) یک روند بولوریک و بهداشتی است

(۳) هر فرایند خط پیشگیری شامل طبعی از مداخلات پزشکی - بهداشتی است

✓ دوره های حضوری

✓ جزوات مکانیه ای

✓ آزمونهای کشوری

موسسه علوم و فنون معین ۰۲۱۸۸۹۱۵۸۴۰ www.mui.ir

برگزارکننده دوره های آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

دفتر مرکزی: تهران، بالاتر از میدان ولیمصر، بعد از ارتشت، کوی پزشک پور، شماره ۱۲

۸۷- نتایج بررسی در یک مرکز آموزشی دختران نشان داده است که مادران در راهنمایی دختران خود در مورد مسائل بهداشتی دوران بلوغ ناتوان هستند. موثرترین روش آموزش به مادران در مورد نحوه ارتباط بین مادر و دختر کدام است؟

- (۱) بحث گروهی (۲) ایفای نقش (۳) پست و جرعه (۴) سخنرانی جمعی

۸۸- برای محاسبه باروری عمومی (GFR) به کدامیک از اطلاعات زیر نیازمندیم؟

- (۱) جمعیت زنان سنین باروری ۲۹-۶۵ سال (۲) جمعیت زنان متاهل همان سال
(۳) جمعیت نوزادان تازه متولد شده پستاندار گذشته (۴) جمعیت وسط سال زنان متاهل بر نوزادان تازه متولد شده

۸۹- ایمنی لاشی از انتقال پادتن IgA از راه شیرمادر به نوزاد در پندو تولد چه نوع ایمنی است؟

- (۱) فعال اکسپانسی (۲) غیرفعال اکسپانسی (۳) غیرفعال طبیعی (۴) فعال طبیعی

۹۰- کدامیک از باورهای زیر در مورد شیردهی صحیح است؟

- (۱) در صورت بروز یرقان، باید شیر مادر تا مدتی قطع شود.
(۲) مکیدن تنگشت و بی‌قراری کودک دلیل ناکافی بودن شیر مادر است.
(۳) در صورت بروز شقاق در پستان، باید شیردهی مکرر از پستان مبتلا ادامه یابد.
(۴) اگر شیر به مدت طولانی در پستان بماند، نباید آن را به شیر خوار داد.

۹۱- در صورتی که مادر باردار نیاز به دریافت خدمات دندانپزشکی داشته باشد مناسب‌ترین زمان:

- (۱) اواسط سه ماهه اول بارداری (۲) بعد از زایمان خدمات ارائه می‌گردد.
(۳) سه ماهه سوم بارداری (۴) سه ماهه دوم بارداری

۹۲- واکسن فلج اطفال:

- (۱) پندو تولد و ۲ بار تا اتمام ۲ سالگی تقطیع می‌گردد.
(۲) ۳ کلا ۶ بار از پندو تولد تا ۶ سالگی تقطیع می‌گردد.
(۳) پندو تولد، ۲ ماهگی، ۴ و ۹ ماهگی تقطیع می‌گردد.
(۴) ۳ کلا ۶ بار از پندو تولد تا اتمام ۲ سالگی تقطیع می‌گردد.

۹۳- در کدام اقدام زیر، سطح پیشگیری صحیح مشخص شده است؟

- (۱) استفاده از پوشش سرین جهت حفاظت از اشته - تبخیر
(۲) استفاده از مکمل اسید فولیک قبل از بارداری - تولد
(۳) لیزر لایمی پای حائز که حلقه دهانی جهت افزایش جریان خون - تنگی
(۴) انجام Cone biopsy در مبتلایان به کلسر سرویکس - تالیم

۹۴- روشهای ارزیابی دریافت غذای کودک:

- (۱) توزین مستقیم، یادآور خوراک ۲۴ ساعت و مشاهده خوراک
(۲) توزین مستقیم - یادآور خوراک ۲۴ ساعت، گرفتن سابقه غذایی کودک از مادر
(۳) روش مشاهده خوراک، یادآور خوراک ۲۴ ساعت
(۴) توزین مستقیم، گرفتن سابقه غذایی کودک از مادر

۹۵- نداشتن لیختن اجتماعی، در دست قرار گرفتن در آغوش و تأخیر رشد شناختی از جمله علائم تکلیفی است که در:

- (۱) اختلال تغذیه‌ای مربوط به هموستازیس Homeostasis دیده می‌شود.
(۲) اختلال تغذیه‌ای مربوط به جدایی Separation دیده می‌شود.
(۳) اختلال تغذیه‌ای مربوط به کمبود پروتئین - انرژی دیده می‌شود.
(۴) اختلال تغذیه‌ای مربوط به دستگیری Attachment دیده می‌شود.

۹۶- شیر مادر در سال دوم زندگی اثر قابل توجهی در بهبود شرایط روانی - اقتصادی خانواده دارد زیرا:

- (۱) موجب کاهش دفعات بیماری می‌گردد.
(۲) مواد ایمنی بخش موجود در آن طیف حفاظتی مهم دارد.
(۳) نیازهای عاطفی رشد و تکامل کودک را تأمین می‌نماید.
(۴) هنوز ۲۳٪ کالری مورد نیاز کودک را تأمین می‌نماید.

موسسه علوم و فنون معین ۰۲۱۸۸۹۱۵۸۴۰ - www.mui.ir

برگزارکننده دوره های آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
دفتر مرکزی: تهران، بالاتر از میدان ولیمصر، بعد از ارتشت، کوی پزشک پور، شماره ۱۲
✓ دوره های حضوری
✓ جزوات مکانی ای
✓ آزمونهای کشوری

۹۷- طبق دستورالعمل مراقبت برنامه کشوری مادری ایمن (Safe Mother hood)، دوره پره نالال شامل:

۱) شروع هفته دوم بارداری تا انتهای روز چهارم پس از تولد

۲) شروع هفته ششم بارداری تا انتهای روز بیست و هشتم پس از تولد

۳) شروع هفته بیست و دوم بارداری تا انتهای روز بیست و هشتم پس از تولد

۴) شروع هفته بیست و دوم بارداری تا انتهای روز چهارم پس از تولد

۹۸- اولین اقدام و توصیه شما در حاملگی ناخواسته به خانم مراجعه کننده به درمانگاه:

۱) اندازه گیری دقیق ارتفاع رحم - ارجاع به متخصص

۲) حمایت روانی مادر، آموزش خطرات سقط جنین

۳) گرفتن دقیق شرح حال - درخواست سونوگرافی

۴) اندازه گیری دقیق ارتفاع رحم - درخواست سونوگرافی

۹۹- تحقیقات نشان می دهد، در کشورهای در حال توسعه، نیمی از زنان بالای ۱۵ سال دچار کوتاه قدی تغذیه ای هستند. در کوتاه

قدی تغذیه ای وجود دارد.

۱) کمبود قد برای وزن

۲) کمبود وزن برای سن

۳) کمبود وزن برای سن

۱۰۰- کدامیک از شاخص های زیر نشان دهنده الکوی باروری در جامعه می باشد؟

۱) میزان باروری عمومی $General\ Fertility\ Rate = GFR$

۲) میزان باروری عمومی نکاحی $General\ Marital$

۳) میزان باروری کلی $Total\ Fertility\ Rate$

۴) میزان اختصاصی باروری سنی $Age\ Specific\ Fertility\ Rate = ASFR$

درس: (بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به عامی)

۱۰۱- یک خانم باردار در هفته ۳۲ بارداری با درد ناگهانی ساق پای راست همراه با ادم و یک ناحیه متورم و دردناک و گرم به قنبر

حدود ۲cm بر روی ساق پا مراجعه نموده است. اولین اقدامی که برای وی توصیه می کنید کدام است؟

۱) ونوگرافی $(Magnetic\ Venography)\ MRV$

۲) سونوگرافی داپلر

۳) انجام سونوگرافی فشاری وریدهای پروگزیمال

۱۰۲- خانم بارداری در هفته ۳۷ بارداری با علائم خستگی، بی اشتها، یبوع، استفراغ، درد شکمی و زردی پیشرونده همراه با

هایپرنتشن و ادم از ۲ هفته پیش، مراجعه نموده است. در آزمایشات انجام شده هایپوکلوترولنی و هایپوآلبومینمی مشاهده شده است.

محتمل ترین تشخیصی کدام است؟

۱) کلساژ ۲) اکلانسی ۳) Portal hypertension ۴) acute fatty liver if pregnancy

۱۰۳- خانم بارداری در هفته ۱۴ بارداری جهت انجام معاینات بارداری مراجعه نموده و در معاینه قلبی، علائم زیر در وی ثبت گردید:

- انبساط ورید Jugular - midsystolic murmurs - Venous hum (continuous) - کدام تشخیصی برای وی محتمل می باشد؟

۱) نارسایی خفیف قلب راست ۲) تغییرات طبیعی دوران بارداری

۳) تنگی درجه آنورت ۴) نارسایی درجه تری کوسید

۱۰۴- یک خانم باردار در هفته ۳۱ بارداری که هفته گذشته دچار سرماخوردگی شده بود، از ۲ روز پیش دچار سرفه، تنگی نفس، درد

قفسه سینه در هنگام دم و خلط سینه شده است. در صورتی که کدام یک از علائم زیر را در وی مشاهده نمایید، توصیه به بستری شدن،

بیمار در بیمارستان می نماید؟

۱) لکوسیتوز $> 35000/mm^3$ در دایرگرافی قفسه سینه

۲) تعداد نفیس ۱۵ در دقیقه، درجه حرارت $38.5^{\circ}C$

۳) تعداد نفیس ۱۲ در دقیقه لکوسیتوز $> 20000/mm^3$

✓ دوره های حضوری

✓ جزوات مکانی ای

✓ آزمونهای کشوری

موسسه علوم و فنون معین ۰۲۱۸۸۹۱۵۸۴۰ - www.mui.ir

برگزارکننده دوره های آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

دفتر مرکزی: تهران، بالاتر از میدان ولیمصر، بعد از ارتشت، کوی پزشک پور، شماره ۱۲

۱۰۵- در یک خانم بارداری که دچار ترومای شکمی بعلت افتادن از پله‌ها شده است، در مقایسه با یک خانم شیردار با همین شرایط، احتمال وقوع کدام عارضه بیشتر است؟

- (۱) پارگی خدان (۲) آسیب کبدی (۳) آسیب کولون (۴) خونریزی خلف شکمی در ارتروپتونیک

۱۰۶- خانمی جهت مشاوره پیش از بارداری مراجعه نموده است. در صورتی که دارای یکت از شرایط زیر باشد؛ تشخیص سندرم متابولیک برای وی مطرح می‌شود؟

(۱) اندازه دور باسن ۱۰۰cm، تری گلیسرید $\frac{mg}{dl}$ ۱۸۰، قند خون ناشتا $\frac{mg}{dl}$ ۱۰۰

(۲) اندازه دور کمر ۹۰cm، فشار خون $\frac{mmHg}{mmHg}$ ۱۲۰، تری گلیسرید $\frac{mg}{dl}$ ۲۰۰

(۳) اندازه دور کمر ۱۱۰cm، فشار خون $\frac{mmHg}{mmHg}$ ۱۲۰، تری گلیسرید $\frac{mg}{dl}$ ۸۰

(۴) تری گلیسرید $\frac{mg}{dl}$ ۲۰۰، فشار خون $\frac{mmHg}{mmHg}$ ۱۲۰، قند خون ناشتا $\frac{mg}{dl}$ ۹۵

۱۰۷- برای خانم بارداری که دچار باکتریوری بدون علامت در هفته ۲۸ بارداری می‌باشد، چه درمانی را توصیه می‌کنید؟

- (۱) تجویز یک دوز ۳ گرمی آموکسی‌سیلین
(۲) نیاز به درمان ندارد. آزمایش مجدد ادرار یک هفته بعد
(۳) یک هفته درمان با آموکسی‌سیلین ۵۰۰mg ۳ بار در روز
(۴) یک هفته درمان با سیپروفلوکساسین ۵۰۰mg ۲ بار در روز

۱۰۸- کدام یک از موارد زیر جزو عوارض شایع و جدی افزایش فشار خون مزمن در دوران بارداری می‌باشد؟

- (۱) دیابت حاملگی (۲) جفت سر رami
(۳) جدا شدن جفت (placental abruption) (۴) حاملگی تبجا

۱۰۹- کدامیک از التهاب‌های زیر با کاهش آلفا فئوپروتئین سرم مادر همراه است؟

- (۱) امفالوئید (۲) تری رومی ۱۸ (۳) گاستروئیدی (۴) جنگوسل

۱۱۰- نسبت لیپتین به اسفنگولپین مایع آمینوتیک در کدام مورد برای ارزیابی رسیدگی به جنین قابل اعتدال است؟

- (۱) خونریزی جفت (۲) خونریزی جنینی (۳) اسپدوز متابولیک (۴) دفع میکروبیم

۱۱۱- فاز تلوزون رشد مو در چه زمانی طولانی‌تر است؟

- (۱) سه ماهه اول (۲) سه ماهه دوم (۳) سه ماهه بعد از زایمان (۴) سه ماهه سوم

۱۱۲- در یک بیمار باردار مبتلا به بدخیمی:

- (۱) جراحی تشخیصی و درمانی را در هر سه ماهه بارداری می‌توان انجام داد
(۲) جراحی تشخیصی را در هر سه ماهه بارداری می‌توان انجام داد
(۳) جراحی تشخیصی را بهتر است به بعد از زایمان موکول کرد
(۴) جراحی درمانی را در هر سه ماهه بارداری می‌توان انجام داد

۱۱۳- در خانم باردار مبتلا به کانسروستات کدام عبارت صحیح است؟

- (۱) با توده‌های مشکوک پستانی نباید تهاجمی برخورد نمود.
(۲) درمقایسه با زنان غیر باردار در stage بالاتر تشخیص داده می‌شوند.
(۳) در مراحل پیشرفته کانسره جراحی و شیمی درمانی و رادیوتراپی باید انجام شود.
(۴) از روشهای تهاجمی مثل بیوپسی اکسیرتال نمی‌توان استفاده نمود.

۱۱۴- در برخورد با نوددهای نیروی ملی دوران بارداری کدام عبارت صحیح است؟

۱) زمان مناسب جراحی برای بدخیمی نیروی بعد از زایمان است.

۲) مایعات توریدر بزرگتر از ۴cm باید پیوسته شوند.

۳) مایعات توریدر بزرگتر از ۲cm باید FNA شوند.

۴) زمان مناسب جراحی برای بدخیمی نیروی بعد از ۲۴ هفتهگی است.

۱۱۵- در یک خانم باردار کدامیک از موارد زیر آلفی محسوب می شود؟

۱) $Hb < 10.5g/dL$ در سه ماهه دوم

۲) $Hb < 12g/dL$ در سه ماهه دوم

۳) $Hb < 10.5g/dL$ در سه ماهه اول

۴) $Hb < 12g/dL$ در سه ماهه اول

۱۱۶- در یک خانم باردار مبتلا به دیابت بارداری در چه صورتی درمان با انسولین توصیه می شود؟

۱) در صورتی که با رژیم غذایی استاندارد $thpp < 125$ نرسد.

۲) در صورتی که با رژیم غذایی استاندارد $FBS < 10$ نرسد.

۳) در صورتی که با رژیم غذایی استاندارد $FBS < 10.5$ نرسد.

۴) در صورتی که با رژیم غذایی استاندارد $thpp < 14$ نرسد.

۱۱۷- در خصوصی درمان نیروی که کیروز در بایاری کدام عبارت صحیح نیست؟

۱) پروفیل نورال داروی انتخابی در درمان نیروی کیروز می باشد.

۲) مصرف متی مازول در سه ماهه اول بارداری با آلتزی نری همراه است.

۳) در صورت بروز تب و گلودرد دارو باید قطع و CBC چک شود.

۴) حداکثر دو هفته پس از شروع درمان تستهای عملکرد نیروی به سطح طبیعی باز می گردد.

۱۱۸- اولین انتخاب درمانی برای عفونت کلامیدیائی طی دوران بارداری کدامیک از موارد زیر است؟

۱) مفر باکسون $250mg/Im$ یک روز

۲) آموگس سیلین $250mg/Q8h$ برای یک هفته

۳) سفی گسیم $400mg$ یک روز

۴) اریتروماکسین $500mg/Q6h$ برای یک هفته

۱۱۹- در پیشگیری از آنفلوآنزا در زنان باردار کدامیک از موارد زیر صحیح نیست؟

۱) واکسیناسیون در افراد دارای مشکلات زمینهای توصیه می شود.

۲) واکسیناسیون در ۸-۱۲ ماهه از بارداری کلینیکی پیشگیری می کند.

۳) واکسن تری واکسیناژال بعد از سه ماهه دوم توصیه می شود.

۴) واکسن تری واکسیناژال بعد از سه ماهه اول توصیه می شود.

۱۲۰- خانم بارداری دچار سوزش سردل در سه ماهه سوم بارداری داشته است توصیه اولیه شما چه می باشد؟

۱) مصرف مایعات کمتر

۲) مصرف آنتی اسید

۳) مصرف مایعات بیشتر

۴) بلند کردن زانو سر در هنگام خوابیدن و مصرف شربت آنتی اسید

