

صبح شنبه
۸۵/۱۲/۱۲

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی
دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل
سال ۱۳۸۶

پرستاری
(کد ۱۴۰۴)

نام و نام خانوادگی داوطلب:	شماره داوطلب:
تعداد سؤال: ۱۴۰	مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

مواد امتحانی رشته پرستاری، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۳۰	۱	۳۰
۲	پرستاری داخلی و جراحی	۴۰	۳۱	۷۰
۳	پرستاری کودکان	۱۵	۷۱	۸۵
۴	روان پرستاری	۲۰	۸۶	۱۰۵
۵	پرستاری بهداشت و جامعه	۳۰	۱۰۶	۱۳۵
۶	پرستاری بهداشت مادران و نوزادان	۱۵	۱۳۶	۱۴۰

اسفند ماه سال ۱۳۸۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد

30-The phrase exposed to could best be replaced by which of the following?

- 1) In contact with
- 2) Familiar with
- 3) Displaying
- 4) Conducting

درس: داخلی و جراحی

۳۱- بیمار ۵۵ ساله ای دچار اختراع طولانی شده است با توجه به پیش پرستاری، کمبود کدام یکه از موارد زیر محتمل تر است؟

- ۱) پتاسیم
- ۲) کلسیم
- ۳) کلسیم
- ۴) سدیم

۳۲- کدام مورد شاخص بهداشتی است؟

- ۱) عدم شیوع بیماری
- ۲) عدم وجود افراد مسن
- ۳) تعداد مرگ و میر نسبی جمعیت
- ۴) وجود کودکان

۳۳- بعد از جمع آوری اطلاعات از بیمار کدام اقدام مداخله اولویت دارد؟

- ۱) روایی اطلاعات
- ۲) فرجام اطلاعات پزشکی
- ۳) تشخیص پرستاری
- ۴) مصاحبه مجدد با بیمار

۳۴- پس از نمونه گیری کامل مصلع، هیچ بیمار معمولاً بعد از چه بدنی قادر به انجام فعالیت های روزانه نخواهد بود؟

- ۱) شش ماه
- ۲) ۱ تا ۲ ماه
- ۳) ۳ تا ۴ ماه
- ۴) یک سال

۳۵- سریعترین واکنش در برابر تولیدگی کدام مورد است؟

- ۱) کاهش سازگاری
- ۲) اختلال آب
- ۳) سردی
- ۴) تغییر در عملکرد

۳۶- شخصی مریض دارد و پزشک معالج وی گفته است که معالجه بی فایده است و ایله پرستار در نظارت بیمار و بستن وی چیست؟

- ۱) در این صورت گفتن حقیقت جایز نیست
- ۲) حقیقت را به خاطر حسرت روحی به بیمار و خانواده بازگو نکند
- ۳) بی تفاوت باشد و زمان ادامه یابد
- ۴) در این صورت گفتن حقیقت جایز است

۳۷- خبر آموزش به بیمار کدام حقوق را باید به بیمار آموزش داد؟

- ۱) بیمار حق ندارد افراد تیم درمان را ببیند
- ۲) بیمار حق ندارد که مرالیت های مربوط به خود را بداند
- ۳) بیمار حق دارد بداند که اطلاعات داده شده از طرف وی کاملاً محرمانه می ماند
- ۴) بیمار حق دارد اطلاعات ثبت شده در پرونده که بر سبب قرون مع شده را مطالعه نماید

۳۸- کدام یکه از موارد ذیل به عنوان رضایت نامه عمل جراحی صحیح است؟

- ۱) رضایت نامه باید آگاهانه بدون اجبار و فرمی که عوارضی در آن ذکر شده امضاء شود
- ۲) فرم رضایت نامه باید به بیمار و بیمار و باطن ده تا آگاهانه و آگاهانه امضاء نماید
- ۳) فرمی که در آن عوارضی قید نشده باشد رضایت نامه است
- ۴) زمانی که درمان تشخیصی باشد رضایت نامه کبی لازم نیست

۳۹- مهم ترین توصیه مرالیتی برای بیمار مبتلا به بیماری منته جسی (STD) کدام مورد زیر است؟

- ۱) مصرف کامل آنتی بیوتیک حداقل به مدت سه هفته
- ۲) درمان همزمان و کامل بیمار و همسر او و اجتناب از تماس جنسی
- ۳) مصرف کامل آنتی بیوتیک همراه با پروبیوتیک
- ۴) آزمایش منکر RPR هفته ای یک بار به همراه دلوو درمانی

۱۰- بهترین توصیه مراقبتی برای پیشگیری از تشکیل سنگهای ادراری کدام مورد زیر است ؟

- ۱) مصرف منظم و زیاد آب و مایعات
- ۲) آزمایش ادراری و تجویز آلکالیزین
- ۳) اجتناب از مصرف لبنیات و غذای پرچرب
- ۴) اجتناب از مصرف چای و لبنیات

۱۱- از جمله نظر پرستاری در جایگزینی مایعات از دست رفته بیماران هیپوتنمیک کدام توصیه مراقبتی زیر مهم است ؟

- ۱) جایگزینی مایعات و مراقبت از هیدراتاسیون
- ۲) جایگزینی تعویض مایعات و مراقبت از هیدراتاسیون
- ۳) جایگزینی تعویض مایعات و مراقبت از هیدراتاسیون
- ۴) استفاده از مایعات محلول هیپوتنمیک و مراقبت از هیدراتاسیون

۱۲- اختلال و سایش منتهی می تواند موجب بروز کدام عارضه زیر شود ؟

- ۱) آلکالوز تنفسی
- ۲) آلکالوز متابولیک
- ۳) اسیدوز متابولیک
- ۴) اسیدوز تنفسی

۱۳- از جمله نظر پرستاری کدام حالت زیر در بیمار خطرناک بوده و نیاز به مداخله فوری دارد ؟

- ۱) $Na = 132 \text{ meq/lit}$
- ۲) $PH = 7.35$
- ۳) $Ca = 3.5 \text{ meq/lit}$
- ۴) $K = 2.2 \text{ meq/lit}$

۱۴- کدام سیستم در تنظیم و اصلاح دقیق PH بدن نقش بیشتری دارد و از چه نظر باید مورد توجه و بررسی بیشتر پرستار باشد ؟

- ۱) تنفس و از نظر تعداد و الگوی تنفس
- ۲) غدد درون ریز از نظر کنترل وزن و جذب و دفع
- ۳) کلیه ها از نظر کنترل جذب و دفع
- ۴) گوارش از نظر کنترل اسهال و یبوست

۱۵- کدام مورد زیر شد از نظر منتهی در اندام جراح به وی توجه عملی می کنند ؟

- ۱) پرستار اسکریب
- ۲) پرستار سیرکولاسیون
- ۳) پرستار اتاق عمل
- ۴) پرستار بیهوشی

۱۶- موثرترین راه مبارزه با همترش بیماری ایدز کدام مورد زیر است ؟

- ۱) دارو درمانی و کنترل تزوینات
- ۲) واکسیناسیون و اجتناب از افراد پرخطر
- ۳) شناسایی افراد آلوده
- ۴) آموزش و کنترل تماس جنسی

۱۷- از نظر مراقبتی ، بیماری با مایه آدنوم و تشخیص کانسرومی بصری شده ، از ضعف ، تنگی نفس ، لاغری بارز و ایالی (Apathy) دارد و

نحت درمان IPPD دو بار در روز می باشد کدام مراقبت پرستاری در اولویت است ؟

- ۱) رژیم و تغذیه مناسب
- ۲) بهداشت و آرامش سازی آرامش
- ۳) کنترل جلد و دفع مایعات
- ۴) رعایت و ضعف بدن

۱۸- بیمار بعد از هیپوفیزکتومی باید از نظر کدام یک از علائم کنترل شود ؟

- ۱) شوک هیپوگلیسمی
- ۲) تاکیکاردی و کاهش فشارخون
- ۳) تنگی تنفس و اسهال
- ۴) افزایش فشارخون و فشارتپش

۱۹- در مورد آسپی فلر آهن کدام مورد صحیح است ؟

- ۱) کاهش گلبولهای سفید
- ۲) دریافت نا کافی آهن از طریق غذا
- ۳) کاهش قرصین سرم
- ۴) گلبولهای قرمز به نمای اسفرومیت

۲۰- به منظور پیشگیری از ترومبوز و استاز کدام مورد صحیح است ؟

- ۱) استفاده از حمام سونا
- ۲) استفاده از ورزش منظم
- ۳) استفاده از حرکات چرخشی ناگهانی
- ۴) محدودیت مصرف مایعات

۵۱- در بیمار مبتلا به آدیسون دیگنیتاسیون عملی به کدام دلیل است ؟

- ۱) آزاد شدن هورمون آدرنال کورتیکوئیدین به همراه هیدروکورتیزولین شدن لیپیدروتین بنا
- ۲) به علت لیپیدروتین بنا که همان لیپیدروتین ها یا دانسیته بالا است
- ۳) هورمون محرکه ملائوسیت یا دانسیته بالا ترشح می شود
- ۴) آزاد شدن هورمون آدرنال کورتیکوئیدین به همراه هیدروکورتیزولین شدن لیپیدروتین بنا

۵۲- چه عاملی برای ستر ترورزمین دو کبد لازم است ؟

- ۱) پروتروزمین در حضور ویتامین B
- ۲) پروتروزمین در حضور ویتامین K
- ۳) پروتروزمین در حضور ویتامین C
- ۴) پروتروزمین در حضور ویتامین D

۵۳- استفاده از الگوی تنفس لب شعله ای منجر به کدام یک از موارد زیر می گردد ؟

- ۱) کاهش فشار در آلوئولها و افزایش دفع دی اکسید کربن
- ۲) افزایش فشار درون آلوئولها و افزایش دفع دی اکسید کربن
- ۳) افزایش فشار در آلوئولها و کاهش دفع دی اکسید کربن
- ۴) افزایش فشار در آلوئولها و کاهش دفع دی اکسید کربن

۵۴- از لحاظ نظر پرستاری مناسب ترین توصیه برای بیماری که دچار تنفوس مؤمن قارچی در اندامهاست :

- ۱) شستوی و دیرینه شایبه و آفتاب گرفتن منظم
- ۲) مصرف کامل داروها و آفتاب گرفتن منظم
- ۳) اجتناب از حضور در جمع و تماس با کودکان
- ۴) شستوی منظم شایبه و مصرف کامل داروی تجویز شده

۵۵- تکرار علامت عصبیت ، تحریک ، گوسگی و خفگی و ملیش قلب در بیمارانی دیابتی مربوط به کدام عارضه زیر است و چه توصیه ای از نظر مراقبتی

دارد ؟

- ۱) هیپرگلیسمی و به همراه داشتن و مصرف چند سی قند در هنگام بروز
- ۲) هیپرگلیسمی و شروع کنواسیوژیس و کم کردن دوز انسولین
- ۳) هیپرگلیسمی و شروع سترم هیپوسمولار و مصرف بیشتر مایعات
- ۴) پدیده سوموگی و توصیه برای مراجعه به پزشک معالج

۵۶- از لحاظ نظر پرستاری بهترین توصیه برای بیمار مبتلا به "کلوئوما جهت کنترل و پیشگیری از حمله حاد کدام مورد زیر است ؟

- ۱) پیراسی و نونومتزی
- ۲) تونومتزی و مصرف منظم دارو
- ۳) لیزر تراپی و مصرف منظم دارو
- ۴) مصرف منظم دارو

۵۷- کدام یک از انواع کری های زیر با جراحی و وسایل کمک شنوایی قابل توانبخشی است ؟

- ۱) مادرزادی
- ۲) اکسپانسیو حسی
- ۳) اکسپانسیو شنوایی
- ۴) مرکب

۵۸- از لحاظ نظر پرستاری مناسب ترین توصیه برای بیمار با کم کلاوی تیروئید کدام مورد زیر است ؟

- ۱) مصرف منظم و مستمر داروی تجویز شده نیم ساعت پس از غذا
- ۲) استراحت و آرامش و دوری از فعالیت زیاد
- ۳) فعالیت بدنی بیشتر به همراه افزایش دوز دارو
- ۴) مصرف منظم و مستمر داروی تجویز شده در حالت ناشتا

۵۹- از نقطه نظر پرستاری برای جبران مایعات تلف شده دو مداخله ای وسیع کدام محلول زیر مناسب است و پرستار در این مدت باید مراقبه چه علامته ای باشد؟

- ۱) - گسترده لا و مراقب هیپوکالمی و شوک باشد
- ۲) - نرمال سالین و مراقب هیپوکالمی و شوک باشد
- ۳) - نرمال سالین هیپوتونیک و مراقب شوک و هیپوکالمی باشد
- ۴) - نرمال سالین هیپرتونیک و مراقب هیپوکالمی باشد

۶۰- در بیمار با حشره مغزی شدت یافتن علائم سردرد، استفراغ، دوربینی، برادیکاردی و هیپرتانسیون می تواند به کدام علامه زیر برگردد و چه اقدام مراقبتی باید انجام داد؟

- ۱) افزایش فشار داخل جمجمه و وضعیت **Supine** و سر بالاتر از تنه
- ۲) شروع تشنج و اجوبه دیلاتشن و وضعیت **Flat**
- ۳) افزایش هسائرم و فشار به بافت مجاور و وضعیت **Supine**
- ۴) نشانه های کاهش و هیپوکالمی است، اکسیژن رسانی و وضعیت **Lateral**

۶۱- از بین رقتن خلاف میلین ساولا و فیبرهای عصبی در کدام بیماری زیر دیده می شود؟

۱) بولانی بل اسکروزیس

۲) پارکینسون

۳) دملس

۴) میاستنی گراووس

۶۲- از نقطه نظر پرستاری دو کدام یک از موارد زیر، استفاده از بیولوگال استیوئیکال غیر اصولی است؟

- ۱) - استفاده نقطه **ST** بیشتر از پنج میلی متر
- ۲) - سن ۶۰-۵۰ سالگی
- ۳) - دوازده ساعت پس از القای کتوس میوکارد
- ۴) - در شروع القای کتوس میوکارد

۶۳- کدام یک از الگوهای تنفسی زیر، توصیه دیدن در فضای بسته (گیمه پلاستیکی) تولید می باشد؟

Bradypneau

Biot respiration

Hyperventilation

Hypoventilation

۶۴- شنیدن صدای تنفس خس خس (**Wheezing**) اصولاً نشانه از احتمال بروز _____ می باشد

۱) التهاب پرده جنب

۲) تشنج راههای هوایی

۳) تشنج راههای هوایی

۴) تشنج راههای هوایی

۶۵- کدام یک از موارد زیر در افزایش فشار داخل مغز تاثیر بیشتری دارد؟

۱) سرخ و ساکن شدن مژگن

۲) استفاده از دیورتیک ها

۳) استراحت مطلق

۴) وضعیت نیمه نشسته

۶۶- به منظور نزدیک ورمی ۷۰ میلی گرم از ویتال (ایلوکالین) یک درماد چند میلی فیلتر لازم می شود؟

۱) ۵۰ و نیم میلی لیتر

۲) پنج میلی لیتر

۳) هشت میلی لیتر

۴) ده میلی لیتر

۶۷- در خصوص بیماری که به نشت گوارشی قلب دوی قوس دیگومین قرار گرفته کدام توصیه را مناسب تر می دانید؟

۱) کنترل فشار خون قبل از استفاده از دارو

۲) کنترل درجه حرارت قبل از استفاده از دارو

۳) کنترل الگوی تنفس قبل از استفاده از دارو

۴) کنترل نبض قبل از استفاده از دارو

۶۸- به منظور انفولون پنج میکروگرم اینتر و گلیسرین (پنج میلی گرم از دارو درماد میلی اینتر میکروست) چند قطره میکروست تنظیم می نمایید؟

۱) پنج قطره

۲) ده قطره

۳) پنجاه قطره

۴) هشتاد قطره

۶۶- به منظور استفاده از اکسژن به مقدار ۱۰ در صد از طریق سند بینی چند لیتر در دقیقه کنتایم می نمایند.
(۱) پنج لیتر در دقیقه (۲) ده لیتر در دقیقه (۳) دو لیتر در دقیقه (۴) شش لیتر در دقیقه

۶۷- سندار مایع پیشهادی برای بیمار که یازده اندازی ندارد (هنوز پالیزی) برای ۱۰ اسفند چند می باشد ؟

(۱) در صد رلیج تشنگی و رضایت بیمار (۲) ۵۰۰-۸۰۰ میلی لیتر
(۳) در حدود ۳۰ میلی لیتر در ساعت (۴) حدود سه لیتر در شبانه روز

درس: پرستاری کودکان

۶۸- آبخار نوزادی یا تولیت عطلانی است ، تحرک پذیری به صورت شکاک ، رنگ بدن صورتی و کیودی اندامها تنفس آرام ولی نامنظم و
شریان قلب کمتر از ۱۰۰ معادل چه عددی می باشد ؟

(۱) عدد ۱ (۲) عدد ۶ (۳) عدد ۷ (۴) عدد ۸

۶۹- دو برقراری ارتباط با کودکان کدام یک از رفتارهای تصدیق کننده (Confirming) زیر از طرف پرستار مناسب است ؟
(۱) Tapping fingers (تنگشت زدن) (۲) Nodding the head (تایید با سر)
(۳) Avoiding eye contact (اجتناب از تماس چشمی) (۴) Interrupting (تعل کردن صحبت)

۷۰- کودکان دو کدام گروه سنی هنگام معاینه فیزیکی (physical examination) ترجیح می دهند دو حالت نشسته بایمان شوند ، در
بیشتر موقعیتها همکاری داشته باشند و والدینشان حضور داشته باشند

(۱) نوزاد (۲) کودکان سن قبل از مدرسه (۳) شیرخواران (۴) کودکان سن مدرسه

۷۱- حسب ترین سایز Gull برای فشارسنج کودکان چیست ؟

(۱) عرض ۷۵۰ دو باز و طول ۷۷۰ دو بازوی کودک
(۲) عرض ۷۷۵ دو باز و طول ۷۸۰ دو بازوی کودک
(۳) عرض ۷۸۰ دو باز و طول ۷۹۰ دو بازوی کودک
(۴) عرض ۷۸۵ دو باز و طول ۷۹۰ دو بازوی کودک

۷۲- کدام یک از گزینه های ذیل دو ارتباط با ضربه به قلب سینه (precordial thump) صحیح می باشد ؟

(۱) در تمامی گروههای سنی کودکان مجاز است (۲) در کودکان سن قبل از مدرسه مجاز است
(۳) برای کودکان مجاز نمی باشد (۴) فقط در دوران شیرخوارگی مجاز است

۷۳- احسن کودکی است دو سن قبل از مدرسه او در خوردن غذای اشتها است معشوقین واه جل کدام است ؟

(۱) مشارکت او در تهیه غذا (۲) وضع قوانین نظایب ای (۳) تنظیم ساعات صرف غذا (۴) منع مصرف هر گونه Snack

۷۴- هر چه صورت شاخص نوده بدنی (BMI) کودکی حدود ۱۰ ساله در معرض خطر ابتلا به وزن تلی می گردد ؟

(۱) بیش از ۱۵ پرستایل (۲) بیش از ۸۵ پرستایل (۳) کمتر از ۸۵ پرستایل (۴) کمتر از ۷۰ پرستایل

۷۵- دو صورت ابتلا کودک به تلی نهفته (Latent) از کدام شیوه جهت سنجش میزان تحرک پذیری عطلانی استفاده می شود ؟

(۱) Chivos tek Sign (نشاند شوشتک) (۲) Throuseau Sign (نشاند توروس)
(۳) Peroneal Sign (نشاند پروتال) (۴) Erb sign (نشاند ارب)

۷۶- کدام اقدام پرستار دو مورد نوزاد که با علامت تلی تنفس ، شکو فرو رفته (تاپی) ، کاهش صداهای تنفسی در یک طرف ریه و تریچچه
پای هیدر آمیوس پسوی شود ، می تواند باعث و نامت حال نوزاد گردد
(۱) خواباندن نوزاد به طرف سبلا (۲) NPO کردن نوزاد

- ۸۰- برای نوزاد مبتلا به اسهال که در بخش شما بستری شده است، کدام مراقبت را انجام می دهید.
- ۱) اسهال، گیری دور شکم
 - ۲) پاستیل منحل عارضه با گاز آفتاب به نرمال منالین
 - ۳) آماده کردن وسایل لنتراسیون
 - ۴) گازول ۵ سی سی سرخ قندی هر دو ساعت

- ۸۱- کودکی بعد از کوشیم شکاف کام (Palatoplasty) از اتاق عمل به بخش آمده است، وقتی که پیدائش شده کدام مداخله زیر مناسب تر است؟
- ۱) قرار دادن کود که به روی شکم
 - ۲) دادن مایعات به خلش پلاستیکی
 - ۳) ساکشن ترشحات دهان و حلق
 - ۴) کنترل درجه حرارت از راه دهان

- ۸۲- کدام یک از علائم بالینی زیر، پرستار را به وجود بیماری شلج مغزی (CP)، مشکوک می کند؟
- ۱) سردی پوست، سوء خاشه، استفراغ
 - ۲) تغییر در توتیت عضلات، غیر طبیعی بودن رنگبها
 - ۳) طولانی شدن پرتان فزبرلوزیک، تشنج
 - ۴) عدم هوشیاری، دستنرمی تنفسی، ناپایداری مریهنگ ها

- ۸۳- برای کودک که ۲/۵ ساله مبتلا به هیدروسفالی، شانت گذاشته شده است، شما به مادر آموزش می دهید که در صورت مشاهده اولین علائم خوب کار نکردن شانت به پزشک مراجعه نمایند، این علائم زوده رس کدامند؟
- ۱) استفراغ و سرگیجه
 - ۲) تشنج و سردرد
 - ۳) ترمور و اختلال هوشیاری
 - ۴) سردرد و بی اشتها

- ۸۴- کدام گزینه زیر درباره هیپوسیتدای صحیح است
- ۱) معمولاً این عارضه به همراه اکتروپلی مثاله دیده می شود
 - ۲) عدم جراحی به موقع باعث عقبی می شود
 - ۳) عمل جراحی دو سه باوق انجام می شود
 - ۴) کودیک قبل از عمل ترمیمی نباید خسته شود

- ۸۵- وزن و شوعه مبتلا به لالسی میلور خوانهان بچه دار شدن هستند پاسخ شما در احتمال ابتلای نوزادشان چیست؟
- ۱) ۷۲۵ سالم، ۷۵۰ مازور، ۷۲۵ نالاسی میور
 - ۲) ۷۲۵ سالم، ۷۲۵ مازور، ۷۵۰ نالاسی میور
 - ۳) ۷۵۰ مازور، ۷۵۰ نالاسی میور
 - ۴) ۷۲۵ مازور، ۷۷۵ نالاسی میور

درس : روان پرستاری

- ۸۶- در پرستاری از بیماری که تحت درمان الکترولیت های (ECI) قرار می گیرد کدام یک از موارد ذیل باید مد نظر قرار گرفته شود؟
- ۱) پیشگیری از خطر آمیواسیون، سقوط، گاز گرینگی زبان
 - ۲) پیشگیری از خطر تشنج، گیجی، سقوط
 - ۳) پیشگیری از خطر فراموشی، گیجی، گاز گرینگی زبان
 - ۴) پیشگیری از خطر تشنج، آمیواسیون، فراموشی

- ۸۷- فردی متقلب زوجه هم دچار می خوانی، دلتوره، احساس غروب، التولنج، کابوسهای شبانه شده است این فرد دچار اختلال است
- ۱) اختلال اضطراب پانیک
 - ۲) اختلال اضطراب منتشر
 - ۳) اختلال اضطراب اساسی
 - ۴) اختلال اضطراب پس از سانحه PTSD

۸۸- دانشجویی که پس از پایان امتحان و چندین بار سوالات و از لحاظ صحیح بودن مرور می کند و بحثا جوابها را بتواند مرتب شیر می دهد احتمالاً دچار ... است

۱) اضطرابه ۲) اضطردگی ۳) ومواس ۴) فوبیا (ترس مرضی)

۸۹- بیمار ۴۵ ساله با علامت توهم شنوایی ، هیزان بزرگ منشی و تشناب توسط خانواده به درمانگاه روان مراجعه می نماید بیمار احتمالاً به بیماری خود تشناب کدام یک از اختلالات زیر متعلق است ؟

۱) اختلال اسکیزوفرنی نوع پارانوئید ۲) اختلال اسکیزوفرنی نوع کاتاتونیک

۳) اختلال پارانوئید ۴) اختلال شخصیت پارانوئید

۹۰- اثر کودکی در است هوش بزرگ هوش حدود ۴۰ دانه باشد در حینت ... قرار می گیرد.

۱) عملکرد هوش مرضی ۲) عقب ماندگی خلیفه ۳) عقب ماندگی متوسط ۴) عقب ماندگی شدید

۹۱- بهترین اشرازی پرستار در آموزش کودک عقب مانده ذهنی ... می باشد

۱) مدت زمان کوتاه ، صبر فراوان ، تکرار فراوان

۲) محتوای کم مدت زمان کوتاه ، تکرار فراوان

۳) محتوای کم ، صبر فراوان ، تکرار فراوان

۴) مدت زمان کوتاه ، محتوای کم ، محیط آموزشی غنی

۹۲- بیماری در هنگام مصاحبه جواب سوالات را دقیق نمی دهد و برای پاسخ مطالب زیادی توضیح می دهد ولی به هدف سوال نمی رسد این نشانه را چه می گویند ؟

۱) انسداد فکر ۲) پریش گویی ۳) حاشیه پردازی ۴) ومواس فکری

۹۳- بیمار به پرستار شکایت می کند که وقتی یک صفحه کتاب را می خواند در انتهای صفحه مثل اینکه چیزی نخوانده است و باید برگردد و از اول متن را بخواند این مشکل را چه می نامند ؟

۱) اختلال در توجه ۲) اختلال در تمرکز ۳) اختلال در تفکر ۴) اختلال در ادراک

۹۴- فردی متعاقب ورزشکشی دچار علامت سردگی می گردد در اینجا ورزشکشی بعنوان چه عملی است ؟

۱) زمینه ساز بیماری ۲) دوام دهنده بیماری ۳) اجتماسی بیماری ۴) آشکارساز بیماری

۹۵- شایعترین عوارض داروهای ضد سردگی می باشد که می تواند منجر به قطع دارو توسط بیمار گردد ... است .

۱) اختلال خواب ۲) اختلال آبی کلپتریک ۳) اختلال حافظه ۴) اختلال ادراک

۹۶- خانواده بیمار روانی به منظور مشارکت در مراقبت لا بیمار سوالات زیادی را طرح کرده و در جستجوی کمک اطلاعات بیشتر در مورد بیماری و درمان آن است . عملکرد وی چه نام دارد ؟

۱) مقابلت مشترک بر سانه (یا مقابلت سانه مدار) ۲) مقابلت مشترک بر سانه (یا مقابلت بر سانه مدار)

۳) سازه سازی ۴) سازه سازی

۹۷- کدام حیوان در مورد بحران صحیح است ؟

۱) بحران رویشد غیر عادی و غیر قابل پیش بینی است که ۶-۴ ماه طول می کشد

۲) بحران رویشد تنش زای شدید و فرطی است که به انفعالات دیوتر مدت نیاز دارد

۳) بحران رویشد یی است که فرد نه می تواند با روشهای معمول حل سانه آن را حل کند و نه راه فرار دارد

۴) بحران رویشد یی است که فرد نه می تواند با روشهای معمول حل سانه آن را حل کند و نه راه فرار دارد

۹۸- آموزش به خانواده بیمارین سوء مصرف مواد یا مبتلا به ایدز به منظور معالفت از افراد در معرض خطر در کدام یک از اقدامات ذیل قرار می

گیرد؟

- ۱) پیشگیری ثانویه ۲) پیشگیری اولیه ۳) پیشگیری ثانیه ۴) توانبخشی و گروه خودیار

۹۹- در طبقه بندی DSM IV اختلالات شخصیت دو کدام معیور تعریف شده است؟

- ۱) معیور I ۲) معیور III ۳) معیور IV ۴) معیور II

۱۰۰- تجویز حسی ادراکات بدون محرکهای با حرکت در محیط عبارت است از:

- ۱) هالوسیناسیون ۲) ایلوژیزون ۳) فلوژیزون ۴) تداعی معانی

۱۰۱- تا چند صد دقیقه طول می کشد برای تکوین یا بیمار روانی؟

- ۱) پیشنهاد می شود زیرایان احساسات بیمار و مهار می کند
۲) لازم و اساسی است زیرا رفتارهای قابل قبول را تثبیت می کند.
۳) فقط مسئولیت پرستار حلقه در شبست است
۴) مهم است ولی همیشه قابل مذاکره می باشد

۱۰۲- کدام یک از اختلالات پرستار دو محیط درمانی مناسب است:

- ۱) دو برابر رفتارهای نامناسب بیمار را کاهش نشان می دهد
۲) تعصبات درمانی را برای بیمار می گیرد
۳) از رفتارهای نامناسب بیمار چشم پوشی می کند
۴) بیمار را تشویق می کند که دو حل نمادها از بیم درمانی کمک گیرد

۱۰۳- در برخورد با بیمار پارانوئید و سوء ظن کدام یک از اقدامات زیر باید اجتناب نمود؟

- ۱) تماس چشمی مستقیم ۲) مکتوب ۳) لمس ۴) تشویق به بیان احساسات

۱۰۴- اهداف اولیه آموزش برای حذف نوسانات عبارت است از:

- ۱) نشان دادن ارتباط آنها با بیماری روانی او
۲) کمک به بیمار برای ارتباط دادن آنها با تشی
۳) کمک به بیمار برای کنترل آنها
۴) درک فضای ترهفات و ارتباط آن با بیماری

۱۰۵- بررسی عوامل محیطی و روانی اجتماعی موثر در ایجاد تشدید بیماری در کدام یک از معیورهای DSM IV مورد بحث قرار می گیرد؟

- ۱) معیور I ۲) معیور III ۳) معیور V ۴) معیور IV

درس: بهداشت و جامعه

۱۰۶- یک کودک ۵ ساله چه واکسن هایی را باید دریافت کند؟

- ۱) سه گانه ، فلج اطفال ، میاتیت B
۲) سه گانه ، فلج اطفال ، MMR
۳) سه گانه ، BCG ، میاتیت B ، سه گانه
۴) BCG ، MMR ، سه گانه

۱۰۷- معیور تضمین توسعه پایدار در جوانی بشری چیست؟

- ۱) تربیت نخبگان سلامت ۲) تضمین سلامت و بهداشت

۱-۸- کدام یک از موارد زیر در مورد اوربون صحیح است؟

- (۱) تجویز واکسن MMR در حُرَت ناشی از HIV پلازماست
- (۲) دو تمام نقاط کشور حُرَت نمی شود
- (۳) ابتلا به آن آپش دانسی انجام نمی کند
- (۴) دوره کمون آن به طور متوسط دو ماه است

۱-۹- طبقه اصلی موالیت های بهداشتی اولیه چیست؟

- (۱) تامین سلامت مردم محروم (۲) ارائه خدمات بهداشتی از واک
- (۳) توزیع عادلانه منابع بهداشتی (۴) ارتقاء سطح بهداشت جامعه

۱-۱۰- داشتن روحیه انتقادپذیری جزء کدامیک از ابعاد سلامت است؟

- (۱) معنری (۲) اجتماعی (۳) عاطفی (۴) روانی

۱-۱۱- آموزش بهداشت در مورد فلج اطفال به مادران جزء کدامیک از ملاحظات زیر است؟

- (۱) پیشگیری (۲) ارتقاء (۳) بازتوانی (۴) درمانی

۱-۱۲- کدام برنامه جزء برنامه های حفاظتی بولیف در کشور ما نیست؟

- (۱) پایش سلامت (۲) پیرو کیفیت خدمات (۳) پیشگیری از سوء تغذیه (۴) کاهش نابری ۵۸

۱-۱۳- کدام آلاینده آبی ناشی از زائدگی مدرن می باشد؟

- (۱) نیترات و نیتریت (۲) مواد رادیواکتیو (۳) سرب (۴) جیوه

۱-۱۴- می آمد استفاده از آب سخت در کدام یک از موارد زیر می تواند جدی تر باشد؟

- (۱) آشپیدن (۲) کشاورزی (۳) رنگهای بنظر (۴) پخت و پز

۱-۱۵- بوی فاضلاب ناشی از چه گاز است؟

- (۱) دی اکسید کربن (۲) مونتر اکسید کربن (۳) گاز کربنیک (۴) هیدروژن سولفید

۱-۱۶- بهره گیری از مای های کامپوزیت در مبارزه با مالاریا در کدام گروه قرار می گیرد؟

- (۱) روشهای مکانیکی (۲) روشهای زیست شناسی (۳) کنترل شیمیایی (۴) کنترل فیزیکی

۱-۱۷- در کدام نوع خانواده چت لسل با هم زنده می می کنند؟

- (۱) مادر سرگز (۲) گسترده (۳) پدر بومی (۴) هست ای

۱-۱۸- کدام مورد جزء بحرانهای اجتماعی است؟

- (۱) طلاق (۲) بلوغ (۳) ازدواج (۴) پاشگی

۱-۱۹- بهترین بهداشتی ترین روش برای از بین بردن راه های خاکی و بهداشتی تریب — می باشد.

- (۱) سوزاندن و دفن بهداشتی (۲) بنبار کردن و بازیافت (۳) تهیه کود و سوزاندن (۴) دفن بهداشتی و سوزاندن

۱-۲۰- کدام یک از خواص نان دهنده عمر فاضلاب است؟

- (۱) رنگ (۲) PH (۳) بو (۴) دما

۱۲۱- باید بیشتر برای کدام گروه زیر عنوان یک خط تولید کننده سلامت به حساب می آید ؟
(۱) اقرا (۲) بیکاران (۳) پیداران (۴) جوانان

۱۲۲- حد انتقال کدام یک از بیماریهای زیر آب نشی میباشد کننده را بازی می کند ؟
(۱) مالاریا (۲) کرم قلاب دلو (۳) حصیه (۴) تب زرد

۱۲۳- از نظر تنظیم خانواده کدامیک از موارد ذیل جزء حاملگی های پرخطر به حساب می آید ؟
(۱) حاملگی های با فاصله گذاری کمتر از ۲ سال
(۲) حاملگی زیر ۲۰ و بالای ۴۰ سال
(۳) حاملگی های چند تلوی
(۴) حاملگی زنان مناطق فقیر

۱۲۴- کدام عامل جهت دستیابی به نیازهای اجتماعی خانواده اهمیت بیشتری دارد ؟
(۱) ساختار نقش (۲) الگوهای ارتباطی (۳) نظام ارزشی (۴) ساختار قدرتی

۱۲۵- کدام مورد از اقدامات پرستار بهداشت جامعه در مرحله آموزش و تکامل خانواده (فردنارشدن) می باشد ؟
(۱) ایجاد وابستگی مثبت بین کودکان و والدین
(۲) پیشگیری از سوخت
(۳) کمک به خانواده در تعیین بهداشت و دیت ها
(۴) اجتنامی کردن کودکان

درس : بهداشت مادران و نوزادان

۱۲۶- بهترین مانع از ایدان زودرس کدام است ؟
(۱) افزایش احتمال عفونت (۲) کمبود ذخیره چربی (۳) منقطع دسترسی تنفسی (۴) کاهش وزن نوزاد

۱۲۷- اولین اقدام در صورت دیسپنئ تنفسی نوزادانی که از مادران متاد به مواد مخدر به دنیا می آید کدام است ؟
(۱) تجویز ناله کشان (۲) برقراری تنوع تنفسی (۳) دادن اکسیژن ضد دوز (۴) نوزادانی آهنگار نوزاد

۱۲۸- حد صوت لرج عصب فونیک ، کدام مناسبه کدام است ؟
(۱) خوابیدن نوزاد به روی شکم (۲) بی حرکت نگه داشتن بدن (۳) تحریک نوزاد برای نفس کشیدن (۴) خوابیدن نوزاد به پهلوئی منلا

۱۲۹- شایعترین علت نابروزی در مردان کدام است ؟
(۱) نارسایی اسیرم (۲) راریکوسل (۳) لوکیت لورونی (۴) انسداد مجاری خفزان

۱۳۰- به عنوان پرستار قبل از تجویز سولفات منیزیم ، به کدام علامت توجه می کنید ؟
(۱) هایپر تانسین (HTN) (۲) کاهش تعداد تنفسی (۳) افزایش تا گهانی ضربان قلب (۴) تشنج و تحریک پذیری

۱۳۱- بالا بودن میزان سدیم کلراید و متابولیسم بدن نوزادان را اسعد بروز چه عارضه هایی بولد شود ؟
(۱) اسیدوز (۲) آکالوز (۳) افزایش CO (۴) هیر کالسی

۱۳۲- دختر وابسته با فشار خون نوزادان جهت صحیح را مشخص نمایید.

- ۱) فشار خون arm حدود ۹-۶ mmHg کمتر از فشار calf می باشد
- ۲) فشار خون سیستولیک calf حدود ۹-۶ mmHg کمتر از فشار arm می باشد
- ۳) فشار خون متوسط arm و calf حدود ۹ mmHg می باشد
- ۴) فشار خون سیستولیک thigh حدود ۹-۶ mmHg از فشار خون arm کمتر است

۱۳۳- کدام یک از موارد زیر نشانه تالاسمی می باشد ؟

- ۱) وزن تولد کمتر از ۳۵۰۰ گرم
- ۲) وزن ۲kg زیر صدک سوم
- ۳) متحلی رشد ثابت
- ۴) اضافه وزن کمتر از ۱۰۰ گرم در ماه در ۶-۷ ماهگی

۱۳۴- در صورت نیاز کودک هیدرومیتال به تنهائی تشخیص یا عمل جراحی بکنه برائیتی صحیح را مشخص نمایید.

- ۱) عدم استفاده از روپندهای سر در صورت نیاز به آنتوبیوتیک و ویدی
- ۲) عدم مصرف آرایش هنگام انجام عمل
- ۳) منع مصرف گلوکز ۵٪ قبل از مصرف آنتوبیوتیک
- ۴) منع مصرف گلوکز ۵٪ بعد از مصرف آنتوبیوتیک

۱۳۵- مولود قلبی منع مصرف قوس های پیشگیری از بارداری کدام است ؟

- ۱) دیابت
- ۲) ترمور خوش خیم کبد
- ۳) لوسردگی
- ۴) حقن های دستگاه ادراری

۱۳۶- برای انجام آمنیوسنتز Amniocentesis چه توصیه ای به مادر می کنید

- ۱) نوشیدن چند لیوان آب
- ۲) مصرف قرص های آرام بخش
- ۳) غذائی کردن متناوب
- ۴) خوابیدن به پهلوى چپ

۱۳۷- بهترین عمل مولود به رشد دلبستگی Attachment مادر به چنین در دوران حاملگی کدام است ؟

- ۱) در یک مادر از بارداری
- ۲) سطح تحریکات مادر
- ۳) حرکات جنین
- ۴) تقلل حاملگی قبلی

۱۳۸- آسیب پذیرترین زمان زندگی جنینی از نظر ایجاد ناهنجاری کدام است ؟

- ۱) هفته های ۳-۱
- ۲) سه ماهه دوم
- ۳) ۸ هفته تولد
- ۴) سه ماهه سوم

۱۳۹- بهترین اقدام پرستاری در مرحله دوم زایمان کنترل کدام است ؟

- ۱) انقباضات رحم
- ۲) خون و بزی ولژن
- ۳) علائم حیاتی مادر
- ۴) ضربان قلب جنین

۱۴۰- در بررسی مادر پس از زایمان در صورت وجود علائم هومن Homans sign به کدام مورد مشکوک می شوید ؟

- ۱) ترمبوفلیت Thrombophlebitis
- ۲) التهاب مثانه Cystitis
- ۳) التهاب لوله ای رحمی Salpingitis
- ۴) آندومتریت Endometritis