

پرستاری (الف) ۹۰-۹۱

پرستاری داخلی جراحی

Site: www.mui.ac.ir - TEL: 88915839

- Email: info@mui.ir

۱. اصطلاح **Early Detection** در بررسی وضعیت سلامت مددجو معادل کدامیک از موارد زیر است؟

- (ب) Primary Prevention
- (د) Risk Management

۲. فایده آگاهی و به کارگیری فرم نیازهای افراد خانواده مددجوی بستری در بخش مراقبت ویژه برای پرستاران کدام مورد است؟

- (ب) اصلاح و مدیریت استرسورهای بخشهای مزبور
- (ج) تکمیل فرمها برای مراقبت مبتنی بر شواهد
- (د) دریافت دستمزد براساس تعریفهای اعلام شده

۳. مهمترین اصل در ارائه مراقبت های بازتوانی کدام مورد است؟

- (ب) مددجو و نیازهای خاص او
- (ج) قابلیت دسترسی برای کلیه افراد جامعه
- (د) عدم نیاز به وسایل تخصصی پیچیده

۴. کدام آزمون برای تشخیص افتراقی بین کاهش شنوایی انتقالی از حسی-عصبی به کار می رود؟

Rinne T

Ticking watch

Weber T

Whisper T

۵. در کدام مورد زیر از پانسمان هیدروکولوئید استفاده می شود؟

- (ب) زخم های عمیق دارای سروز زیاد
- (ج) زخم های دردناک مزمن
- (د) زخم های نواحی برجستگی استخوانی
- (الف) زخم های دارای اگزودای کم

۶. در بررسی وضعیت سلامت پوست، متوجه ضایعه ای می شویم که به شرح زیر است: نامنظم، دارای برآمدگی، ناشی از اسکار زخم جراحی، با اسکاری دائمی و بزرگ شونده. نام این آسیب کدام است؟

- (ب) Nodule
- (ج) Macule
- (الف) Keloid
- (د) Vesicle

۷. شایع ترین علامت بالینی آنمی چیست؟

- (ب) خستگی
- (ج) تنگی نفس
- (د) آنژین
- (الف) رنگ پریدگی

۸. در کدام آنمی، پان سیتوپنی دیده می شود؟

- (ب) Megaloblastic
- (ج) Aplastic
- (الف) Sickel cee
- (د) Thalassemia

۹. مورد مناسب برای تعییه پیس میکر دائمی کدام نوع بلوک است؟

- (ب) درجه دو
- (ج) درجه سه
- (د) شاخه ای راست
- (الف) درجه یک

۱۰. خانم ۶۳ ساله ای پس از کاشت استنت در آنوریسم، در **ICU** بستری شده است. پرستار باید او را از نظر سندروم پس از کاشت بررسی نماید. نشانه های این سندروم کدام است؟

- (ب) لکوپنی
- (الف) ترومبوسیتوز

ج) تب

د) پلی سیتیمی

۱۱. در آموزش به بیمار قلبی دارای حلقه آنولوپلاستی مورد صحیح کدام است؟

- الف) مصرف آنتی بیوتیک قبل از تزریقات وریدی
 ب) پیگیری دوره ای برای اطمینان از عدم جابجایی حلقه
 ج) مصرف آنتی بیوتیک قبل از روش گذاری دندان
 د) مصرف ضد انعقاد به مدت سه ماه

۱۲. مورد صحیح درباره سرعت ضربان قلب پس از پیوند قلب کدام است؟

الف) سرعت قلب در حالت استراحت ۵۰-۶۰ بار در دقیقه است.

ب) رسیدن به سرعت مطلوب ۲۰-۳۰ دقیقه طول می کشد.

ج) سرعت قلب پیوندی در شروع بیش از حد نیاز است.

د) از آتروپین می توان برای کنترل سرعت قلب پیوندی استفاده کرد.

۱۳. در صورت تغذیه مددجو با مایعات هیپرتونیک، حجم ضروری آبی که بایستی به وی داده شود کدام است؟

- الف) ده میلی لیتر به ازای صد کیلوکالری ماده دریافتی
 ب) ده میلی لیتر به ازای یک کیلوکالری ماده دریافتی
 ج) یک میلی لیتر به ازای یک کیلوکالری ماده دریافتی
 د) یک میلی لیتر به ازای صد کیلوکالری ماده دریافتی

۱۴. در مراقبت پرستاری از بیمار دچار هایپرکلیسمی، کدام مورد بایستی رعایت شود؟

الف) محدودیت مصرف مایعات

ب) کنترل علائم هایپرفلکسی، دزهیدراتاسیون

د) محدود کردن دریافت کلسیم روزانه

ج) تشویق بیمار به تحرک و فعالیت

۱۵. پس از عمل جراحی تعویض مفصل ران، کدامیک از عوارض زیر بایستی به دلیل احتمال DVT مورد بررسی قرار گیرد؟

الف) خطر خونریزی از محل تزریق، درد اندام های تحتانی، راش پوستی

ب) درد شدید، ورم یکطرفه، سرخی در مسیر ورید

ج) در موقع جابجایی اندام، نشت مایع بین سلولی از ناحیه جراحی

د) عدم تعادل همودینامیک، تهوع، استفراغ، هموپتری

۱۶. در بیماری که به علت آدنوم هیپوفیز تحت جراحی ترانس اسفنوئیدی قرار گرفته است کدامیک از مراقبت های زیر باید صورت گیرد؟

الف) قرار دادن بیمار در وضعیت صاف

ج) مسوک زدن روزانه دندانها

ب) کنترل میدان بینایی هر دو روز یکبار

د) کنترل وزن مخصوص ادرار بعد از هر بار ادرار کردن

۱۷. کدام مورد زیر از اقدامات احتیاطی در رابطه با آنوریسم مغزی است؟

الف) قرار دادن بیمار در پوزیشن نشسته

ب) استفاده از انمای ملایم در صورت بیوست

ج) پوشیدن جوراب الاستیک ضدآمبولی

د) افزایش محرك های محیطی خارجی

۱۸. در دیسترنس تنفسی ناشی از سندرم گیلن باره، پرستار به کدامیک از موارد زیر باید توجه کند؟

الف) انقباضات تونیک

ج) افزایش سرفه

ب) شکایت از سردرد

د) تحیریک پذیری

۱۹. پرستار در برنامه مراقبتی بیمار مبتلا به اسکلروز مولتیپل، بایستی به کدام مورد بیشتر توجه نماید؟

الف) سوندگذاری متناوب ادراری

ب) استفاده از مسهل روزانه

ج) مصرف مایعات در حد ۲ لیتر در ۲۴ ساعت

د) انجام ROM در مفاصل هر یک ساعت

۲۰. برای پیشگیری از بروز سندرم دامپینگ اقدام مؤثر پرستاری کدام است؟

الف) مصرف غذا با حجم بیشتر

ب) مصرف چربی بیشتر در رژیم غذایی

ج) مصرف مایعات همراه با غذا

د) مصرف کربوهیدرات بیشتر

۲۱. در مراقبت از بیمار مبتلا به اولسرپتیک مورد صحیح کدام است؟

الف) مصرف آسپرین جهت رفع درد

ب) کنترل بیمار از نظر افزایش وزن

ج) کاهش اضطراب بیمار

د) انفوزیون وریدی محلول قندی

- ۲۲. اولین محلول تغذیه ای در بیمار پس از جراحی ژنستومی کدام است؟**
- (الف) نرمال سالین
 (ب) رینگر
 (ج) دکستروز ۵٪
 (د) سرم قندی نمکی
- ۲۳. کدامیک از موارد زیر باید در مراقبت از بیمار دارای کلستومی آموزش داده شود؟**
- (الف) تعویض حلقه چسب دار اطراف استومی هر ۴-۵ روز
 (ب) شستشوی پوست ناحیه با محلول های ضد عفونی کننده
 (ج) تشویق بیمار به مصرف آدامس و نوشابه های کربنه
 (د) شستشوی کیسه بیش از دو بار در روز
- ۲۴. در بیمار مبتلا به سرطان پستان پس از برش غدد لنفاوی زیر بغل، کدامیک از موارد زیر بایستی آموزش داده شود؟**
- (الف) پوشیدن دستکش الاستیک در حین کارهای منزل
 (ب) عدم استفاده از دست سمت مبتلا
 (ج) شستشوی پوست با آب و صابون در صورت آسیب
 (د) نحوه استفاده از تیغ جهت تراشیدن ناحیه زیر بغل
- ۲۵. در مراقبت پرستاری از بیمار تحت رادیو تراپی داخلی به کدام مورد بایستی توجه کرد؟**
- (الف) استفاده از پرسنل ثابت پرستاری در مراقبت
 (ب) قرار گرفتن ملاقات کنندگان در فاصله نیم متری منبع رادیواکتیو
 (ج) محدودیت ملاقات با بیمار به مدت نیم ساعت روزانه
 (د) قرار گرفتن در پایین تخت بیمار حین ارائه مراقبت
- ۲۶. در جایگزینی مایعات در بیماران دچار سوختگی کدام مورد صحیح می باشد؟**
- (الف) جایگزینی مایعات با محلول های الکترولیتی هیپوتونیک
 (ب) تزریق نیمی از کل مایع مورد نیاز در ۱۲ ساعت اول
 (ج) استفاده از مایعات کلئیدی جهت کاهش مایعات مورد نیاز
 (د) تزریق ۱۰ سی سی محلول ایزو تونیک به ازای هر کیلو وزن بدن در درصد سوختگی
- ۲۷. در استفاده از کورتیکو استروئیدهای موضعی در بیماران مبتلا به پسوریازیس کدام مورد صحیح می باشد؟**
- (الف) مصرف استروئیدهای موضعی قوی در ناحیه صورت
 (ب) استفاده دراز مدت از کورتون های قوی
 (ج) استفاده از پانسمان بسته جهت افزایش اثر کورتون
 (د) کنترل علائم افزایش فعالیت عده فوق کلیه
- ۲۸. مراقبت پرستاری از بیمار تحت جراحی اورتوفیگ موئیدستومی کدام است؟**
- (الف) تشویق به مصرف سدیم بیشتر و پتاسیم کمتر
 (ب) تحرک و فعالیت جهت پیشگیری از بیوست
 (ج) بررسی اختلال الکترولیتی و بروز اسیدوز متabolیک
 (د) توصیه به تخلیه ادرار از راه روده دو تا سه بار در روز
- ۲۹. کدامیک از موارد زیر در مراقبت کوژنکتیویت ویروسی صحیح است؟**
- (الف) استفاده از کمپرس گرم جهت کاهش التهاب
 (ب) عدم استفاده از اشک مصنوعی در زمان بروز علائم
 (ج) عدم استحمام در مدت تشديد علائم التهاب
 (د) استراحت در منزل به مدت ۳-۷ روز
- ۳۰. در درمان و مراقبت از بیمار مبتلا به گلوكوم کدام مورد زیر صحیح است؟**
- (الف) کاهش فشار داخل چشم به میزان ۷۰٪ کمتر از فشار فعلی
 (ب) استفاده از داروهای چشمی موضعی آنتی کولینرژیک
 (ج) شروع درمان با بالاترین دوز داروهای چشمی موضعی
 (د) درمان هر دو چشم در صورت افزایش فشار داخلی هر دو چشم
- ۳۱. تشخیص پرستاری مهم در بیمار مبتلا به حاملگی نابجا کدام مورد زیر است؟**
- (الف) درد حاد ناشی از حاملگی در ناحیه لوله
 (ب) انکار و ناباوری در رابطه با از دست دادن حاملگی
 (ج) عدم اطمینان از آینده باروری
 (د) شوک هموراژیک
- ۳۲. در مراقبت از پای دیابتیک چه مواردی باید آموزش داده شود؟**
- (الف) استفاده از لوسيون بين انگشتان پا
 (ب) مصرف پمادهای گیاهی در صورت زخم
 (ج) پوشیدن کفش های جلو باز
 (د) پوشیدن متناسب کفش های نو

۳۳. کدامیک از موارد زیر از عوارض درمان کتواسیدوز دیابتیک می باشد؟

- الف) افزایش میزان سدیم خون ناشی از خون رسانی ناکافی بافتی
- ب) افزایش بار مایعات بدن ناشی از دریافت مایعات زیاد در مدت کم
- ج) افزایش سدیم و پتاسیم خون ناشی از هیدراتاسیون
- د) جابجایی پتاسیم از داخل به خارج سلول با مصرف انسولین

۳۴. در مراقبت از بیمار مبتلا به پر کاری تیروئید کدام مورد توصیه می شود؟

- الف) عدم تجویز سرم قندی
- ب) تشویق بیمار به تحرک و فعالیت
- د) تشویق بیمار به مصرف مایعات گرم
- ج) مصرف غذاهای پر پروتئین و پر کالری

۳۵. در مراقبت تغذیه ای از بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیه کدام مورد صحیح است؟

- الف) محدودیت دریافت غذاهای پر کالری و پر پروتئین
- ب) مصرف پروتئین های باارزش بیولوژیکی بالا
- د) محدودیت در مصرف مواد معدنی
- ج) مصرف مایعات ۵۰۰-۶۰۰ سی در روز

۳۶. در مایعات و داروهای دریافتی بیمار مبتلا به نارسایی حاد کلیه توجه به میزان کدام یون اهمیت دارد؟

- الف) پتاسیم
- ب) سدیم
- د) فسفر
- ج) کلسیم

۳۷. هدف از شستشوی مثانه پس از جراحی پروستاتکتومی کدام است؟

- الف) جلوگیری از بروز مسمومیت با آب
- ب) کاهش درد ناشی از برش جراحی
- د) جلوگیری از انسداد مجرای ادراری
- ج) پیشگیری از بروز اختلال الکترولیتی

۳۸. در طی فرایند جداسازی بیمار از ونتیلاتور زمان مناسب برای خارج کردن لوله تراشه کدام است؟

- الف) هوشیاری بیمار و تلاش تهویه ای کافی در تنفس خودبخودی
- ب) رسیدن گازهای خونی شریانی به حد طبیعی
- ج) برخورداری بیمار از شاخص الکترولیتی قابل قبول
- د) عدم نیاز به فشار مثبت انتهای بازدمی

۳۹. مؤثرترین اقدام برای دفع منوكسیدکربن از خون مسمومین با این گاز کدام است؟

- الف) تجویز اکسیژن٪ ۱۰۰
- ب) تجویز اکسیژن پر فشار
- د) دیالیز سریع بیمار
- ج) رساندن اکسیژن با ماسک ونچوری

۴۰. برنامه زمانی مناسب برای ساکشن داخل لوله تراشه در بیمار تحت درمان با ونتیلاتور کدام است؟

- الف) هر ساعت یک بار
- ب) هر دو ساعت یک بار
- د) یک بار در هر شیفت
- ج) بر اساس نیاز بیمار

پرستاری کودکان

۴۱. کدام واژه دربرگیرنده مفهوم تواناسازی در مراقبت خانواده محور است؟

- الف) احساس کنترل داشتن بر نیازهای کودک
- ب) کسب قدرت از سوی خانواده
- ج) احساس تسلط بر شرایط موجود
- د) ابداع راه های جدید رفع نیاز کودک

۴۲. برای مراقبت پرستاری کارآمد از کودک، شناسایی و ارزیابی کدام مورد اساسی تر است؟

- الف) اقتصاد خانواده
- ب) فرهنگ بیمار
- د) باورهای بهداشتی
- ج) اعضای کلیدی خانواده

۴۳. برای ملاقات خواهران و برادران شیرخوار در **NICU**. مورد صحیح کدام است؟

- الف) جایز است ولی عفونت را گسترش می دهد.
- ب) جایز است ولی کار مراقبتی را مختلط می کند.
- د) اساس مراقبت طبیعی را تشکیل می دهد.
- ج) به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

۴۴. مناسب ترین اقدام در زمان کج خلقی کودک نوپا کدام است؟

- الف) نزدیک شدن به کودک و محدود ساختن فعالیت
- ب) بی توجهی اولیه و پس از آرام شدن، محبت کردن
- ج) دادن پاسخ مثبت به خواست های کودک
- د) ارجاع کودک به روانپزشک کودکان

۴۵. در آموزش مادر دارای کودک مبتلا به درماتیت ناشی از پوشک کدام صحیح است؟

- الف) استفاده از لامپ گرمایی برای خشک کردن
- ب) مالیدن مخلوطی از پماد اکسید روی و کرم ضد قارچ
- ج) استفاده از پودر تالک بجای پودر نشاسته ذرت
- د) استفاده از پوشک یکبار مصرف

۴۶. عامل اصلی رفتارهای خطرپذیر در سن مدرسه کدام است؟

- الف) حس کنجکاوی
- ب) حس استقلال
- ج) اضطراب
- د) تأثیر همسالان

۴۷. در مراقبت های پرستاری بعد از عمل جراحی میلوموننگوسل کدام صادق است؟

- الف) منوعیت پوشک کردن تا زمان ترمیم محل جراحی
- ج) قرار دادن کودک در وضعیت طاقباز
- ج) منعویت لمس درمانی تا زمان برقراری تعادل حسی حرکتی
- د) عدم سونداز کودک به منظور پیشگیری از عفونت

۴۸. اولین قدم برای بیان خبر ناخوشایند مرگ فرزند پیه والدین کدام است؟

- الف) ارزیابی سطح اگاهی والدین
- ب) حساس بودن به واکنش والدین
- ج) عرضه اطلاعات به زبان قابل درک
- د) فراهم سازی موقعیت مناسب

۴۹. در خصوص اصول گرفتن کودک از شیر کدام صحیح است؟

- الف) از شیر گرفتن کودک بایستی در عرض یک هفته انجام گیرد.
- ب) وعده غذایی شبانه، آخرین وعده ای است که قطع می شود.
- ج) مناسب ترین زمان از شیر گرفتن کودکان نیمه دوم سال اول است.
- د) اصل اساسی در گرفتن کودک از شیر، میل و خواست وی است.

۵۰. پوست خشک و خشن، لثه اسفنجی، نرم و متورم، تحریک پذیری و تأخیر الیتم زخم، کمبود کدام ویتامین را در شیر خوار نشان می دهد؟

- الف) B
- ب) C
- ج) D
- د) E

۵۱. کنجکاوی و تجسس های زیاد در محیط از خصوصیات کدام دوره است؟

- الف) شیر خواری
- ب) نوپایی
- ج) خردسالی
- د) سن مدرسه

۵۲. معمولاً کدام ویژگی رفتاری در تمایز بین رفتار طبیعی و مشکل دار کودک اهمیت کمتری دارد؟

- الف) نوع
- ب) دفعات
- ج) پراکندگی
- د) مدت زمان

۵۳. در کدام بیماری کودک مبتلا را باید از زن باردار جدا نگه داشت؟

- الف) فلنج اطفال
- ب) سرخجه
- ج) سرخک
- د) اوریون

۵۴. در شیر خواران نارس بدحال، کدامیک از روش های برقراری ارتباط با نوزادان مجاز می باشد؟

- الف) ماساژ دادن
- ب) بغل کردن
- د) حرکت دادن اندامها
- ج) صحبت کردن

۵۵. در نوزادان دارای پای چمامی مادرزادی، بعد از دو هفته اول، فواصل تعویض گج گیری کدام است؟

- (ب) ۳-۴ هفته
- (الف) ۱-۲ هفته
- (د) ۵-۶ هفته
- (ج) ۴-۵ هفته

۵۶. کدام اقدام در اپی گلوتیت حاد اشتباه است؟

- (ب) آنتی بیوتیک درمانی
- (الف) تجویز اکسیژن مرطوب
- (د) معاینه گلو با آبسلاگ
- (ج) حفظ خونسردی

۵۷. برونوکواسپاسیم ناشی از فعالیت چه زمانی به حداقل شدت می رسد؟

- (ب) پایان فعالیت
- (الف) شروع فعالیت
- (د) ۱۵-۲۰ دقیقه بعد از فعالیت
- (ج) ۱۰-۱۵ دقیقه بعد از پایان فعالیت

۵۸. زمان شروع تغذیه کودکان بعد از عمل جراحی قلب کدام است؟

- (ب) روز چهارم تا پنجم
- (الف) روز دوم تا سوم
- (د) روز هشتم تا هفتم
- (ج) روز ششم تا هفتم

۵۹. کدام مورد در آموزش والدین برای مصرف دیگوکسین کودک صحیح است؟

الف) در صورت فراموشی یک دوز به مدت بیش از ۲ ساعت تکرار نشود.

ب) بعد از مصرف دارو به هیچ عنوان مسوک زده نشود.

ج) دارو در قسمت وسطی، عقب زبان قرار داده شود.

د) در صورت عدم مصرف دارو بیش از ۲ روز به پزشک مراجعه شود.

۶۰. درمان اسهال کودکان مصرف کدام مورد جایز است؟

- (ب) سوب مرغ یا آبگوشت
- (الف) مایعات صاف شده
- (د) رژیم غذایی طبیعی
- (ج) رژیم برت

روان پرستاری

۶۱. مجموع واکنش های جسمی، روانی، ذهنی و رفتاری بدن در مقابل محرك های درونی یا بیرونی را می نامند.

- (ب) بحران
- (الف) بحران
- (د) مقابله
- (ج) سازگاری

۶۲. مهمترین هدف بهداشت روان کدام است؟

- (ب) آموزش به بیماران روانی
- (الف) حمایت از بیمار روانی
- (د) ارتقا سلامت روانی
- (ج) درمان اختلالات روانی

۶۳. در پیشگیری سطح اول از اختلالات روانی کدامیک از موارد زیر انجام می گیرد؟

- (ب) غربالگری بیماری
- (الف) بررسی های اپیدمیولوژیک و اتیولوژیک
- (د) درمان سریع اختلال روانی
- (ج) انجام توانبخشی سریع در بیمار

۶۴. موفقیت آمیز بودن مصاحبه در بررسی وضعیت روانی مددجو بیشتر به کدامیک از عوامل زیر بستگی دارد؟

- (ب) داشتن اگاهی و دانش از بیماری ها
- (الف) صحیح انجام شدن فرایند مصاحبه
- (د) آگاهی از مهارت های انجام مصاحبه
- (ج) اعتماد و احترام میان پرستار و مددجو

۶۵. توصیف زیر نشاندهنده وجود کدامیک از مکانیسم های دفاعی می باشد؟

- جایگزینی رفتار قابل قبول با یک خواسته دست نیافتانی
- (الف) عکس العمل سازی
- (ب) والايش
- (د) همانندسازی
- (ج) برون فکنی

۶۵. کدامیک از تکنیک های درمانی بین فردی در جمله زیر میان پرستار و مددجو صورت گرفته است؟
پرستار: در مورد این مسأله چطوری احساس می کنی؟

- (الف) تشویق به مقایسه
- (ب) بیان مجدد
- (ج) سئوال باز
- (د) خلاصه نمودن

۶۶. بهترین روش مدیریت تعارض توسط روانپرستار کدام است؟

- (الف) همکاری
- (ب) رقابت
- (ج) تطابق
- (د) سازش

۶۷. در مصرف کدامیک از داروهای زیر نیاز به محدودیت غذایی و دارویی وجود دارد؟

- (الف) EPs
- (ب) TCAs
- (ج) SSRIa
- (د) MAOIs

۶۸. کدامیک از تکنیک های غیردرمانی ارتباط بین فردی در جمله زیر میان پرستار و بیمار صورت نپذیرفته است؟

مددجو به پرستار: من در مورد این مسأله نگران هستم
پاسخ پرستار: جای نگرانی نیست، همه چیز حل خواهد شد.

- (الف) بیان احساسات
- (ب) اطمینان غلط دادن
- (ج) توضیح دادن
- (د) تعبیر و تفسیر کردن

۶۹. اقدام پرستاری در مورد مددجویی که هذیان دارد کدام است؟

- (الف) سئوال نمودن در مورد جزئیات هذیان
- (ب) منع نمودن مددجو در انجام فعالیت های گروهی و درمان ها
- (ج) تمکز بر احساس منتج از هذیان تا محتوای آن
- (د) بحث کردن با مددجو در مورد هذیان

۷۰. کدام گزینه از تعاریف قاطعیت می باشد؟

- (الف) تجاوز به حقوق دیگران
- (ج) انتخاب فعالیت برای دیگران

۷۱. از علائم ویژه وابستگی به مواد کدام است؟

- (الف) قادر نبودن به انجام کارهای واگذار شده به شخص
- (ب) بروز تغییرات روان شناختی در حین و یا بعد از استفاده
- (د) نشان دادن اختلالات شناختی و علائم تهاجمی
- (ج) بروز نشانه ها و علائم ترک در صورت قطع دارو

۷۲. کدامیک از مداخلات پرستاری در مواجهه با بیمار مضری از اقدامات اولیه می باشد؟

- (الف) ماندن با مددجو و ایجاد حس امنیت در او
- (ب) احساس همدردی و صحبت با مددجو
- (د) صحبت در مورد علل و منبع اضطراب
- (ج) محول نمودن فعالیتی به مددجو

۷۳. کدامیک از فعالیت های زیر در جهت ارتقا مهارت های سازگاری در بیماران با بی اشتہایی عصبی مؤثر است؟

- (الف) قاطعیت درمانی
- (ب) گروه درمانی
- (ج) ورزش درمانی
- (د) کار درمانی

۷۴. در آموزش به خانواده بیماری که به افسردگی اساسی مبتلا بوده است و از بیمارستان ترجیح شده است ذکر نکات زیر ضروری است بجز :

(الف) دادن مسئولیت به بیمار در انجام بعضی از کارهای خانه

(ب) آموزش در مورد تغذیه صحیح و ورزش

(ج) ایجاد تغییرات در زندگی بیمار در هنگام بهبودی افسردگی

(د) آموزش در مورد داروها و عوارض انها

۷۶. اقدام پرستاری در مورد اطمینان از دریافت مایعات کافی توسط بیمار در هنگام تجویز کدام دارد؟

- ب) لارگاکتیل
- الف) کربنات لیتیوم
- ج) هالوپریدول
- د) ایندرال

۷۷. کدامیک از موارد زیر رفتار شاخص افسردگی در کودکان و نوجوانان است؟

- ب) هذیان
- الف) اضطراب
- ج) وسوس فکری
- د) تحریک پذیری

۷۸. نگرانی بیش از حد پیرامون حوادث گذشته و آینده، علائم شایع جسمی مانند سردرد و معده درد مربوط به کدامیک از اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانان می باشد؟

- ب) اضطراب منتشره
- الف) فوبیای خاص
- ج) اختلال هراس
- د) وسوس جبری

۷۹. در کمک به خانواده هایی که یکی از اعضاء خود را به تازگی از دست داده اند کدام مورد صحیح است؟

- ب) سعی کنید آنها را بیشتر تنها بگذارید
- الف) سعی کنید آنها را بیشتر تنها بگذارید
- ج) از صحبت کردن در مورد فرد فوت شده اجتناب گردد.
- د) بیشتر به آنها گوش بدهید و کمتر صحبت کنید.

۸۰. کدامیک از داروهای زیر در جهت ثبات خلق و خوی به کار می رود؟

- ب) سرترالین
- الف) کلوزاپین
- ج) کاربامازپین
- د) لارگاکتیل

پرستاری بهداشت جامعه

۸۱. علامت اختصاری واکسن پولیو تزریقی کدام است؟

- ب) DTP
- الف) OPV
- ج) PPD
- د) IPV

۸۲. اگر پس از تزریق واکسن هپاتیت B در بدو تولد مشخص شود که نوزاد از مادر HBs Ag+ به دنیا آمده است حداقل مهلت دریافت ایمونوگلوبولین اختصاصی هپاتیت B کدام است؟

- ب) یک هفته بعد از تولد
- الف) بلا فاصله پس از تزریق واکسن
- د) سه هفته بعد از تولد
- ج) دو هفته بعد از تولد

۸۳. چنانچه طی دو هفته پس از تلقیح واکسن های زنده ویروسی (بجز پولیو خوارکی و تب زرد) به هر علت گاماگلوبولین وریدی تزریق شود کدام اقدام صورت می گیرد؟

- ب) تکرار واکسن پس از ۴ ماه
- الف) تکرار واکسن پس از ۶ ماه
- د) عدم تکرار واکسن
- ج) تکرار واکسن پس از ۳ ماه

۸۴. بعد از پایان چند سالگی تزریق واکسن سه گانه ممنوع است و باید از واکسن دو گانه ویژه بزرگسالان استفاده شود؟

- ب) ۴
- الف) ۳
- د) ۵
- ج) ۶

۸۵. نشانگر حساس برای دسترسی، میزان استفاده و کارایی خدمات بهداشتی به ویژه مراقبت های دوران بارداری کدام است؟

- ب) میرایی شیرخواران زیر یکسال
- الف) میرایی کودکان زیر ۵ سال
- د) میرایی نوزادان زیر ۲۸ روز
- ج) امید به زندگی در بدو تولد

۸۶. هدف از ایمن سازی ایجاد کدام گزینه است؟

- ب) پاسخ ثانویه در برابر پادگن
- الف) پاسخ اولیه در برابر پادگن
- د) ایمنی یاخته ای
- ج) حافظه ایمنی شناختی

- ۸۷.** در کدام گزینه از بین بردن مخزن عفونت مطلوب ترین تدبیر است؟
- (ب) پولیومیلیت
 - (الف) سل انسانی
 - (ج) سرخ
 - (د) تب مالت
- ۸۸.** اقدام ضروری در پیشگیری سطح اول برای انتقال عفونت **HIV** در معتادان کدام است؟
- (ب) درمان دارویی
 - (الف) غربالگری
 - (د) جداسازی و درمان
 - (ج) توزیع سرنگ استریل
- ۸۹.** عبارت زیر تعریف کدام گزینه است؟
- نظرارت مداوم بر همه جنبه های بروز و انتشار بیماریها که برای مبارزه کارساز مناسب است
- (ب) بیماریابی
 - (الف) مبارزه با بیماری ها
 - (د) قرنطینه
 - (ج) مراقبت از بیماری ها
- ۹۰.** محتوی یک برنامه آموزش بهداشت منطبق بر دانش علمی، فرهنگ عمومی و اهداف اجتماعی می باشد. کدام اصل آموزش بهداشت رعایت شده است؟
- (الف) جامعیت
 - (ب) قابل قبول بودن
 - (ج) از دانسته به ندانسته
 - (د) یادگیری از طریق عمل
- ۹۱.** کدام گزینه جامع تر و دربرگیرنده بقیه موارد است؟
- (ب) دانش فرهنگی
 - (الف) حساسیت فرهنگی
 - (د) مهارت فرهنگی
 - (ج) شایستگی فرهنگی
- ۹۲.** منظور از الگوهای تعامل تکرار شونده و قابل پیش بینی در خانواده کدام مورد است؟
- (ب) ساختار نقش
 - (الف) فرایند خانواده
 - (د) نظام ارزشی
 - (ج) ساختار ارتباطات
- ۹۳.** پرستار بهداشت جامعه می خواهد روابط بین اعضای خانواده و روابط هر یک از اعضای خانواده با نهادهای اجتماعی را بررسی نماید. ابزار بررسی مناسب کدام است؟
- (الف) ژنوگرام
 - (ب) اکومپ
 - (ج) بازدید منزل
 - (د) نقشه خانواده
- ۹۴.** عامل اصلی ایجاد بحران در خانواده کدام است؟
- (ب) کیفیت روابط
 - (الف) ناتوانی در سازگاری
 - (د) شدت استرس
 - (ج) منابع ناکافی
- ۹۵.** علت اصلی غفلت فیزیکی از کودک کدام است؟
- (ب) کم سوادی
 - (الف) فقر زیاد
 - (د) مشغله زیاد
 - (ج) سن پائین
- ۹۶.** در کدام خانواده خشونت بیشتر روی می دهد؟
- (ب) ثروتمند
 - (الف) منزوی
 - (د) تک فرزند
 - (ج) میانسال
- ۹۷.** ارزیابی خطر و طراحی برنامه عملیاتی جهت تقلیل اثرات بلایای قابل پیش بینی در کدام مرحله بلایا انجام می شود؟
- | | |
|-------------|-------------|
| Pre Impact | Impact |
| Predictable | Post Impact |
- ۹۸.** مؤثرترین عامل در واکنش روانشناختی به بلایا کدام است؟
- (ب) محدود بودن سیستم های حمایتی
 - (الف) دسترسی به خدمات امداد و نجات
 - (د) درک فرد از واقعه
 - (ج) نزدیکی به محل حادثه

۹۹. اقدامی که در تریاژ اولیه ترومای روانشناختی مددجو را بهبود می بخشد کدام است؟

- ب) نگهداری خانواده در کنار هم
- د) بررسی سطح استرس فرد

الف) انجام کارهای مددجو

ج) جدا کردن کودکان از والدین

۱۰۰. پرستاران شاغل در بخش عفونی بیشتر در معرض کدام عوامل خطرزای ناشی از کار قرار دارند؟

- ب) مکانیکی
- د) فیزیکی

الف) شیمیایی

ج) زیست شناختی

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

۱۰۱. مهمترین عامل در انتخاب روش های پیشگیری از بارداری کدام است؟

- ب) ارزان بودن
- د) استفاده آسان

الف) مؤثر بودن

ج) قابل قبول زوجین

۱۰۲. علت اصلی کرامپ پا در مددجویان حامله کدام است؟

- ب) بزرگی رحم
- د) کشیدگی پا

الف) کمبود فسفر و کلسیم

ج) ناشناخته

۱۰۳. توصیه شما به مادر باردار جهت برطرف شدن آنهوع و استفراغ کدام است؟

- ب) خوردن مایعات فراوان بین غذا
- د) خوردن لبپنیات و مواد حاوی کلسیم

الف) خالی نگهدارشتن معده

ج) افزایش تعداد دفعات غذا

۱۰۴. مددجویی با درد زایمان مختصر و دیلاتاسیون ۳ به بیمارستان مراجعه کرده است. توصیه پرستار به او کدام است؟

الف) به منزل برگرد و زمانی که دردها شدیدتر شد مجدداً مراجعت نماید.

ب) برای مصرف قرص آرام بخش در بیمارستان بستری شود.

ج) فوراً برای القای زایمان آماده شود.

د) در بیمارستان بماند و با محیط زایمان آشنا شود.

۱۰۵. مددجو در سه ماهه دوم بارداری است و از بیوست شکایت دارد. چه توصیه ای به او می کنید؟

- ب) نوشیدن مایعات
- د) حمام نشسته

الف) ورزش Kegel

ج) تمرينات تنفسی

۱۰۶. برای انجام سونوگرافی توصیه شما به مادر کدام است؟

- ب) تعداد حرکات جنین را به پزشک گزارش دهد.
- د) مثانه اش را پر نگهدارد.

الف) به پهلوی چپ بخوابد و پاهای خود را جمع کند.

ج) از ژلهای ضددرد استفاده کند.

?

۱۰۷. کدام مورد در ضربان قلب جنین غیرطبیعی است؟

- ب) افت دبررس
- د) افزایش ضربان با شروع انقباضات رحمی

الف) تغییرپذیری ضربه به ضربه

ج) افت زودرس

۱۰۸. عارضه هنگام القا زایمان با اکسی توسمین کدام است؟

- ب) انقباضات هیپرتونیک
- د) آتونی رحم

الف) تشنج

ج) خونریزی

۱۰۹. دلیل انتخاب زایمان به روش سزارین کدام است؟

- ب) وجود انقباضات هیپوتونیک
- د) تمایل زوجین

الف) سابقه زایمان سریع

ج) وجود تبخال واژینال

۱۱۰. برای کاهش درد مددجو چندزا در هنگام معاینه واژینال توسط پزشک کدام اقدام پرستاری ضروری است؟

- ب) توضیح ضرورت معاینه به مددجو

الف) استفاده از بی حسی موضعی

- ج) توصیه به پزشک برای انتخاب سایر روش های معاینه د) قرار دادن مددجو در وضعیت مناسب
- 111. علت جدا شدن زودرس جفت کدام است؟**
- (الف) سن امادر
 - (ج) مادران سینگاری
 - (ب) ناشناخته
 - (د) تعداد حاملگی
- 112. مراقبت پرستاری از نوزاد مبتلا به فلچ عصب صورتی کدام است؟**
- (الف) قرار دادن سردر سمت آسیب دیده
 - (ج) انجام فیزیوتراپی از بدو تولد
 - (ب) تغذیه نوزاد منحصر با لوله گاواز
 - (د) پیشگیری از آسیب به قرنیه
- 113. پرستار هنگام فتوترایی نوزاد باید به کدامیک از موارد زیر توجه نماید؟**
- (الف) بررسی ادم دست و پا
 - (ب) اطمینان از بسته بودن چشمها
 - (ج) قطع سرم در هنگام فتوترایی
 - (د) پوشانیدن لباس کافی
- 114. اولین علت خونریزی بعد از زایمان کدام است؟**
- (الف) اختلالات انعقادی
 - (ج) پشت و رو شدن رحم
 - (ب) پارگی کانال زایمانی
 - (د) آتونی رحم
- 115. دلیل توصیه شما به مددجویان حامله برای بستن کمربند ایمنی در اتومبیل پیشگیری از کدام مورد در صورت تصادف است؟**
- (الف) جدا شدن زودرس جفت
 - (ج) کمردرد
 - (ب) ترمیوفلیت
 - (د) پرولاپس بند ناف
- 116. برای پیشگیری از PIH رژیم غذایی باید حاوی کدام باشد؟**
- (الف) پتاسیم
 - (ج) کلسیم
 - (ب) سدیم
 - (د) فسفر
- 117. مادر حامله با جفت سرراهی به بیمارستان مراجعه می کند. انجام کدام مورد صحیح است؟**
- (الف) بررسی ضربان قلب جنین با مانیتورینگ داخلی
 - (ج) ارزیابی سلامت جنین با OCT
 - (ب) تجویز داروهای ضددرد
 - (د) بررسی میزان خون از دست رفته
- 118. در کدام سقط، خاتمه حاملگی ممنوع است؟**
- (الف) اجتناب ناپذیر
 - (ج) فراموش شده
 - (ب) سقط ناقص
 - (د) تهدید به سقط
- 119. اقدام پرستاری قبل از تزریق ویتامین K کدام است؟**
- (الف) اندازه گیری سطح Prothrombin
 - (ج) محافظت دارو از تابش نور
 - (ب) تمیز کردن ناحیه تزریق با بتادین
 - (د) خوابانیدن نوزاد به روی شکم
- 120. نوزادی دچار یرقان شیر مادر شده و سطح بیلی روبین به 20 mg/dL رسیده است. اقدام ضروری کدام است؟**
- (الف) تعویض سریع خون
 - (ج) قطع شیردهی به مدت کوتاه جهت بررسی بیشتر
 - (ب) تشویق مادر به شیردهی هر سه ساعت
 - (د) مراقبت از نوزاد هنگام تشنج

پاسخنامه

پاسخ	سوال	پاسخ	سوال	پاسخ	سوال
گزینه (د) صحیح است.	.۴۱	گزینه (ج) صحیح است.	.۲۱	گزینه (الف) صحیح است.	.۱
گزینه (ج) صحیح است.	.۴۲	گزینه (الف) صحیح است.	.۲۲	گزینه (ب) صحیح است.	.۲
گزینه (د) صحیح است.	.۴۳	گزینه (الف) صحیح است.	.۲۳	گزینه (الف) صحیح است.	.۳
گزینه (ب) صحیح است.	.۴۴	گزینه (ج) صحیح است.	.۲۴	گزینه (ب) صحیح است.	.۴
گزینه (د) صحیح است.	.۴۵	گزینه (ج) صحیح است.	.۲۵	گزینه (الف) صحیح است.	.۵
گزینه (د) صحیح است.	.۴۶	گزینه (ج) صحیح است.	.۲۶	گزینه (الف) صحیح است.	.۶
گزینه (الف) صحیح است.	.۴۷	گزینه (ج) صحیح است.	.۲۷	گزینه (ب) صحیح است.	.۷
گزینه (د) صحیح است.	.۴۸	گزینه (ج) صحیح است.	.۲۸	گزینه (ج) صحیح است.	.۸
گزینه (ب) صحیح است.	.۴۹	گزینه (د) صحیح است.	.۲۹	گزینه (ج) صحیح است.	.۹
گزینه (ب) صحیح است.	.۵۰	گزینه (د) صحیح است.	.۳۰	گزینه (ج) صحیح است.	.۱۰
گزینه (ب) صحیح است.	.۵۱	گزینه (الف) صحیح است	.۳۱	گزینه (د) صحیح است.	.۱۱
گزینه (الف) صحیح است.	.۵۲	گزینه (ج) صحیح است.	.۳۲	گزینه (ب) صحیح است	.۱۲
گزینه (ب) صحیح است.	.۵۳	گزینه (ب) صحیح است	.۳۳	گزینه (ج) صحیح است.	.۱۳
گزینه (ج) صحیح است.	.۵۴	گزینه (ج) صحیح است.	.۳۴	گزینه (ج) صحیح است.	.۱۴
گزینه (الف) صحیح است.	.۵۵	گزینه (ب) صحیح است	.۳۵	گزینه (ب) صحیح است	.۱۵
گزینه (د) صحیح است.	.۵۶	گزینه (الف) صحیح است	.۳۶	گزینه (د) صحیح است	.۱۶
گزینه (ج) صحیح است.	.۵۷	گزینه (د) صحیح است.	.۳۷	گزینه (ج) صحیح است.	.۱۷
گزینه (ب) صحیح است	.۵۸	گزینه (الف) صحیح است	.۳۸	گزینه (ب) صحیح است	.۱۸
گزینه (د) صحیح است.	.۵۹	گزینه (ب) صحیح است	.۳۹	گزینه (ج) صحیح است.	.۱۹
گزینه (د) صحیح است.	.۶۰	گزینه (ج) صحیح است.	.۴۰	گزینه (ب) صحیح است	.۲۰



سوال	پاسخ	سوال	پاسخ	سوال	پاسخ
.۱۰۱	گزینه (الف) صحیح است.	.۸۱	گزینه (د) صحیح است.	.۶۱	گزینه (ب) صحیح است.
.۱۰۲	گزینه (ج) صحیح است.	.۸۲	گزینه (ب) صحیح است.	.۶۲	گزینه (د) صحیح است.
.۱۰۳	گزینه (ج) صحیح است.	.۸۳	گزینه (الف) صحیح است.	.۶۳	گزینه (الف) صحیح است.
.۱۰۴	گزینه (د) صحیح است.	.۸۴	گزینه (د) صحیح است.	.۶۴	گزینه (ج) صحیح است.
.۱۰۵	گزینه (ب) صحیح است.	.۸۵	گزینه (ب) صحیح است.	.۶۵	گزینه (ب) صحیح است.
.۱۰۶	گزینه (د) صحیح است.	.۸۶	گزینه (ج) صحیح است.	.۶۶	گزینه (ج) صحیح است.
.۱۰۷	گزینه (ب) صحیح است.	.۸۷	گزینه (د) صحیح است.	.۶۷	گزینه (الف) صحیح است.
.۱۰۸	گزینه (ج) صحیح است.	.۸۸	گزینه (د) صحیح است.	.۶۸	گزینه (د) صحیح است.
.۱۰۹	گزینه (ج) صحیح است.	.۸۹	گزینه (ج) صحیح است.	.۶۹	گزینه (ب) صحیح است.
.۱۱۰	گزینه (د) صحیح است.	.۹۰	گزینه (ب) صحیح است.	.۷۰	گزینه (ج) صحیح است.
.۱۱۱	گزینه (ب) صحیح است.	.۹۱	گزینه (ج) صحیح است.	.۷۱	گزینه (د) صحیح است.
.۱۱۲	گزینه (د) صحیح است.	.۹۲	گزینه (الف) صحیح است.	.۷۲	گزینه (ج) صحیح است.
.۱۱۳	گزینه (ب) صحیح است.	.۹۳	گزینه (ب) صحیح است.	.۷۳	گزینه (الف) صحیح است.
.۱۱۴	گزینه (د) صحیح است.	.۹۴	گزینه (الف) صحیح است.	.۷۴	گزینه (ب) صحیح است.
.۱۱۵	گزینه (الف) صحیح است.	.۹۵	گزینه (الف) صحیح است.	.۷۵	گزینه (ج) صحیح است.
.۱۱۶	گزینه (ج) صحیح است.	.۹۶	گزینه (الف) صحیح است.	.۷۶	گزینه (الف) صحیح است.
.۱۱۷	گزینه (د) صحیح است.	.۹۷	گزینه (ب) صحیح است.	.۷۷	گزینه (د) صحیح است.
.۱۱۸	گزینه (د) صحیح است.	.۹۸	گزینه (د) صحیح است.	.۷۸	گزینه (ب) صحیح است.
.۱۱۹	گزینه (ج) صحیح است.	.۹۹	گزینه (ب) صحیح است.	.۷۹	گزینه (د) صحیح است.
.۱۲۰	گزینه (ج) صحیح است.	.۱۰۰	گزینه (ج) صحیح است.	.۸۰	گزینه (ج) صحیح است.

