

## پرستاری سالمندی ۹۰-۹۱

### پرستاری داخلی و جراحی

Site: www.mui.iран - TEL: 88915839

- Email: info@mui.ir

۱. مهمترین اصل در ارائه مراقبت های بازتوانی کدام مورد است؟

- (الف) مددجو و نیازهای حاصل او
- (ب) مقرن به صرفه بودن هزینه ها
- (ج) قابلیت دسترسی برای کلیه افراد جامعه
- (د) عدم نیاز به وسایل تخصصی پیچیده

۲. برای کاهش عوارض ناشی از دهیدراتاسیون در افراد مسن پر خطر کدام اقدام زیر در اولویت قرار دارد؟

- (الف) استفاده از مایعات وریدی هایپر اسمولار
- (ب) مانیتورینگ قلبی عروقی
- (ج) CBR کردن بیمار و کنترل I&O
- (د) تشخیص و مداخله زودهنگام

۳. آموزش هایی که پس از عمل جراحی ماستوئید به بیمار داده می شود کدام است؟

- (الف) مصرف غذای پر پروتئین، دوری از سر و صدای محیطی، مصرف به موقع آنتی بیوتیک ها
- (ب) دست نزدن و نخاراندن محل جراحی، چرب کردن گوش خارجی با سوپ
- (ج) ضرورت سرفه و عطسه با دهان باز، اجتناب از فین کردن، جلوگیری از ورود آب به گوش محل جراحی
- (د) مصرف محدود مایعات، کنترل ترشح مایعات از گوش، بلند نکردن باز بیش از ۵ کیلوگرم

۴. کدام آزمون برای تشخیص افتراقی بین کاهش شنوایی انتقالی از حسی-عصبی به کار می رود؟

- (الف) وبر. Weber T
- (ب) Rinne T
- (ج) نجوا. Whisper T
- (د) تیک تیک ساعت. Ticking watch

۵. در کدام مورد زیر از پانسمان هیدروکولوئید استفاده می شود؟

- (الف) زخم های دارای اگزو دای کم
- (ب) زخم های عمیق دارای سرزو زیاد
- (ج) زخم های دردناک مزمن
- (د) زخم های نواحی برجستگی استخوانی

۶. در جایگزینی مایعات در بیماران دچار سوختگی کدام مورد صحیح می باشد؟

- (الف) جایگزینی مایعات با محلول های الکترولیتی هیپوتونیک

(ب) تزریق نیمی از کل مایع مورد نیاز در ۱۲ ساعت اول

(ج) استفاده از مایعات کلولیدی جهت کاهش مایعات مورد نیاز

(د) تزریق ۱۰ سی سی محلول ایزوتونیک به ازای هر کیلو وزن بدن در درصد سوختگی

۷. در استفاده از کورتیکو استرتوئیدهای موضعی در بیماران مبتلا به پسوریازیس کدام مورد صحیح می باشد؟

- (الف) مصرف استرتوئیدهای موضعی قوی در ناحیه صورت
- (ب) استفاده درازمدت از کورتون های قوی

(ج) استفاده از پانسمان بسته جهت افزایش اثر کورتون

- (د) کنترل علائم افزایش فعالیت غده فوق کلیه

۸. پوست چرم مانند به چه دلیل و در کدام مقطع سنی مشاهده می شود؟

- (الف) به کار بردن لیزر برای مقاصد زیبایی در جوانی
- (ب) تماس دائمی با اشعه ماوراء بنفش و در سالمندی

(ج) استفاده از سولار به میزان زیاد و در نوجوانی

- (د) استفاده بی رویه از کرم های ضدآفتاب در جوانی

۹. مورد مناسب برای تعییه پیس میکر دائمی کدام نوع بلوک است؟

- (الف) درجه یک
- (ب) درجه دو

(ج) درجه سه

۱۰. خانم ۶۳ ساله ای پس از کاشت استنت در آنوریسم، در **ICU** بستری شده است. پرستار باید او را از نظر سندروم پس از کاشت بررسی نماید. نشانه های این سندروم کدام است؟

- ب) لکوپنی
- د) پلی سیتمی
- الف) ترموبوستیوز
- ج) تپ

۱۱. در آموزش به بیمار قلبی دارای حلقه آنولوپلاستی مورد صحیح کدام است؟

- ب) پیگیری دوره ای برای اطمینان از عدم جابجایی حلقه
- الف) مصرف آنتی بیوتیک قبل از تزریقات وریدی
- د) مصرف ضد انعقاد به مدت سه ماه
- ج) مصرف آنتی بیوتیک قبل از روکش گذاری دندان

۱۲. مورد صحیح درباره سرعت ضربان قلب پس از پیوند قلب کدام است؟

- الف) سرعت قلب در حالت استراحت ۵۰-۶۰ بار در دقیقه است.
- ب) رسیدن به سرعت مطلوب ۲۰-۳۰ دقیقه طول می کشد.
- ج) سرعت قلب پیوندی در شروع بیش از حد نیاز است.

د) از آتروپین می توان برای کنترل سرعت قلب پیوندی استفاده کرد.

۱۳. کدام مورد زیر به مبتلایان به آنژین صدری آموزش داده می شود؟

الف) در صورت مصرف استامینوفن به دلایل دیگر، می تواند مصرف آسپرین را قطع کند.

ب) برخلاف پلاویکس، اثرات آسپرین چند روز پس از شروع مصرف آغاز می شود.

ج) با توجه به تعداد راه های تأثیر داروهای ضد انعقاد، معمولاً بیش از یک داروی ضدپلاکتی تجویز می شود.

د) ۴۸ ساعت پس از شروع مصرف پلاویکس، مصرف آسپرین را قطع نماید.

۱۴. شایع ترین علامت بالینی آنمی چیست؟

- الف) رنگ پریدگی
- ج) تنگی نفس
- ب) خستگی

۱۵. در کدام آنمی، پان سیتوپنی دیده می شود؟

- الف) Sickel cee
- ج) Aplastic
- ب) Megaloblastic

۱۶. برای بیماری که داروهای مسکن غیراستروئیدی مصرف می کند، پرستار در موقع آموزش به بیمار کدام علائم را بایستی مورد توجه قرار دهد؟

الف) خونریزی گوارشی، درد شکمی، مدفوع تیره، هماتمز

ب) خونریزی داخل مفاصل، تورم و التهاب اطراف مفاصل دست

ج) تهوع، استفراغ، درد زیر جناغ، سفتی شکم

د) خونریزی زیرجلدی سوزنی، محدودیت دامنه حرکتی مفاصل تحتانی

۱۷. پس از عمل جراحی تعویض مفصل ران، کدامیک از عوارض زیر بایستی به دلیل احتمال **DVT** مورد بررسی قرار گیرد؟

الف) خطر خونریزی از محل تزریق، درد اندام های تحتانی، راش پوستی

ب) درد شدید، ورم یکطرفه، سرخی در مسیر ورید

ج) در موقع جابجایی اندام، نشت مایع بین سلولی از ناحیه جراحی

د) عدم تعادل همودینامیک، تهوع، استفراغ، همopoتزری

۱۸. کدامیک از موارد زیر در مورد حدود طبیعی کلسترول صحیح می باشد؟

- الف) 100 - 140 mg/dL
- ب) 210 - 240 mg/dL
- ج) 150 - 190 mg/dL

۱۹. در طی فرایند جداسازی بیمار از ونتیلاتور زمان مناسب برای خارج کردن لوله تراشه کدام است؟

الف) هوشیاری بیمار و تلاش تهویه ای کافی در تنفس خودبخودی

۲۰. مؤثر نرین اقدام برای دفع منوکسید کربن از خون مسمومین با این گاز کدام است؟
- (الف) تجویز اکسیژن ۱۰۰٪
  - (ب) تجویز اکسیژن پر فشار
  - (ج) رساندن اکسیژن با ماسک و نچوری
  - (د) دیالیز سریع بیمار
۲۱. برنامه زمانی مناسب برای ساکشن داخل لوله تراشه در بیمار تحت درمان با ونتیلاتور کدام است؟
- (الف) هر ساعت یک بار
  - (ب) هر دو ساعت یک بار
  - (ج) بر اساس نیاز بیمار
  - (د) یک بار در هر شیفت
۲۲. در آموزش خود مراقبتی به بیمار ضرعی مورد صحیح کدام است؟
- (الف) عدم مصرف دارو با قطع حملات تشنجی مداوم
  - (ب) کنترل عالم بی خوابی، سردرد، کاهش فعالیت
  - (ج) ماساژ لثه ها و استفاده روزانه از نخ دندان
  - (د) استفاده از وان بجای دوش جهت استحمام
۲۳. در بیماری که به علت آدنوم هیپوفیز تحت جراحی ترانس اسفنوئیدی قرار گرفته است کدامیک از مراقبت های زیر باید صورت گیرد؟
- (الف) قرار دادن بیمار در وضعیت صاف
  - (ب) کنترل میدان بینایی هر دو روز یکبار
  - (ج) مسوک زدن روزانه دندانها
  - (د) کنترل وزن مخصوص ادرار بعد از هر بار ادرار کردن
۲۴. در بیمار مبتلا به سکته مغزی که دچار نقايس عصبی شده اقدام پرستاری کدام است؟
- (الف) چرخانیدن سر در جهت خلاف اختلال بینایی
  - (ب) قرار دادن اشیا در سمت مخالف میدان دید
  - (ج) تلفیق اشارات کلامی با نشانه های بصری
  - (د) تغییر مداوم مکان وسایل مورد نیاز جهت مراقبت
۲۵. در دیسترس تنفسی ناشی از سندروم گیلن باره، پرستار به کدامیک از موارد زیر باید توجه کند؟
- (الف) انقباضات توپیک
  - (ب) شکایت از سردرد
  - (ج) افزایش سرفه
  - (د) تحیریک پذیری
۲۶. کدام مورد زیر از اقدامات احتیاطی در رابطه با آنوریسم مغزی است؟
- (الف) قرار دادن بیمار در پوزیشن نشسته
  - (ب) استفاده از انمای ملایم در صورت بیوست
  - (ج) پوشیدن جوراب الاستیک ضدآمبولی
۲۷. تریاد کوشینگ در بیماران با افزایش شدید فشار ICP با کدامیک از عالم زیر مشخص می شود؟
- (الف) افزایش فشار خون دیاستول - کاهش فشار نبض - برادیکاردی
  - (ب) افزایش فشار خون دیاستول - تاکیکاردی - پهن شدن فشار نبض
  - (ج) افزایش فشار خون سیستولیک - کاهش فشار نبض - تاکیکاردی
  - (د) افزایش فشار خون سیستولیک - پهن شدن فشار نبض - برادیکاردی
۲۸. در مراقبت پرستاری پس از جراحی کوله سیستکتومی به کدام مورد باید توجه کرد؟
- (الف) قرار دادن کیسه تخالیه بالاتر از سطح کمر
  - (ب) کنترل رنگ اسکلرا و تهوع و استفراغ
  - (ج) اندازه گیری صفرای جمع شده هر دو ساعت
  - (د) کلمپ نیوب تخلیه یک ساعت قبل از غذا
۲۹. برای پیشگیری از بروز سندروم دامپینگ اقدام مؤثر پرستاری کدام است؟
- (الف) مصرف غذا با حجم بیشتر
  - (ب) مصرف چربی بیشتر در رژیم غذایی
  - (ج) مصرف مایعات همراه با غذا
  - (د) مصرف کربوهیدرات بیشتر
۳۰. در مراقبت از بیمار مبتلا به اولسریپتیک مورد صحیح کدام است؟
- (الف) مصرف آسپرین جهت رفع درد
  - (ب) کنترل بیمار از نظر افزایش وزن
  - (ج) کاهش اضطراب بیمار
  - (د) انفوزیون وریدی محلول قندی

۳۱. کدامیک از موارد زیر باید در مراقبت از بیمار دارای کلستومی آموزش داده شود؟

- الف) تعویض حلقه چسب دار اطراف استومی هر ۴-۵ روز
- ب) شستشوی پوست ناحیه با محلول های ضدغونی کننده
- ج) تشویق بیمار به مصرف آدامس و نوشابه های کربنه
- د) شستشوی کیسه بیش از دو بار در روز

۳۲. اولین محلول تغذیه ای در بیمار پس از جراحی ژئنوتومی کدام است؟

- الف) نرمال سالین
- ب) رینگر
- ج) دکستروز ۵٪

- د) سرم قندی نمکی

۳۳. در مایعات و داروهای دریافتی بیمار مبتلا به نارسایی حاد کلیه توجه به میزان کدام یون اهمیت دارد؟

- الف) پتاسیم
- ب) سدیم
- ج) کلسیم
- د) فسفر

۳۴. مراقبت پرستاری از بیمار تحت جراحی اور تروسیگموئیدستومی کدام است؟

- الف) تشویق به تحرک و فعالیت جهت پیشگیری از یبوست
- ب) توصیه به تخلیه ادرار از راه روده دو تا سه بار در روز
- ج) بررسی اختلال الکترولیتی و بروز اسیدوز متابولیک
- د) کاهش درد ناشی از برش جراحی

۳۵. هدف از شستشوی مثانه پس از جراحی پروستاتکتومی کدام است؟

- الف) جلوگیری از بروز مسمومیت با آب

- ج) پیشگیری از بروز اختلال الکترولیتی

۳۶. در مراقبت تغذیه ای از بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیه کدام مورد صحیح است؟

- الف) محدودیت دریافت غذاهای پر کالری و پر پروتئین
- ب) مصرف پروتئین های بالرزش بیولوژیکی بالا
- ج) مصرف مایعات ۵۰۰-۶۰۰ سی در روز
- د) محدودیت در مصرف مواد معدنی

۳۷. کدامیک از موارد زیر در مراقبت کوژنکتیویت ویروسی صحیح است؟

- الف) استفاده از کمپرس گرم جهت کاهش التهاب
- ب) عدم استفاده از اشک مصنوعی در زمان بروز علائم
- ج) عدم استحمام در مدت تشديد علائم التهاب
- د) استراحت در منزل به مدت ۷-۱۰ روز

۳۸. کدام مورد زیر در بیمار تحت جراحی کاتاراکت صحیح است؟

- الف) استفاده از قطره میدریاتیک قبل از جراحی
- ب) مصرف آسپرین جهت تسکین درد
- ج) کاهش حساسیت به نور در شب
- د) طبیعی بودن کاهش بینایی پس از جراحی

۳۹. در درمان و مراقبت از بیمار مبتلا به گلوكوم کدام مورد زیر صحیح است؟

- الف) کاهش فشار داخل چشم به میزان ۷۰٪ کمتر از فشار فعلی
- ب) استفاده از داروهای چشمی موضعی آنتی کولیتزریک
- ج) شروع درمان با بالاترین دوز داروهای چشمی موضعی
- د) درمان هر دو چشم در صورت افزایش فشار داخلی هر دو چشم

۴۰. در مراقبت پرستاری از بیمار دچار هایپر کلسیمی، کدام مورد بایستی رعایت شود؟

- الف) محدودیت مصرف مایعات
- ب) کنترل علائم هایپرفلکسی، دزهیدراتاسیون
- ج) تشویق بیمار به تحرک و فعالیت
- د) محدود کردن دریافت کلسیم روزانه

۴۱. در مراقبت های پرستاری جراحی ماستکتومی کدام مورد صحیح می باشد؟

- الف) برنامه ریزی روتین جهت ملاقات بیمار با افراد دارای جراحی مشابه
- ب) آموزش مراقبت از زخم جراحی در منزل
- ج) تشویق بیمار به ورزش های بازو و پایین نگهدارشتن دست مبتلا
- د) استفاده از بانداز الاستیک دست مبتلا جهت پیشگیری از ادم لنفاوی

۴۲. کدامیک از موارد زیر کاندید مناسب جهت جراحی پروفیلاکتیک در سرطان می باشد؟

- الف) بیماران دارای علائم بالینی پیشرفته
- ب) افراد دارای اسکار جراحی وسیع

۴۳. کدامیک از اقدامات زیر در بیمار دچار انعقاد منتشر داخل عروقی درست است؟
- (ا) تزریق پلاسمای تازه منجمد شده
  - (ب) افزایش فعالیت فیزیکی روزانه
  - (ج) جلوگیری از ایجاد ترومبوس وریدهای سطحی
  - (د) ارزیابی مداوم از نظر وجود نبض متناقض

۴۴. در مراقبت از بیمار مبتلا به آدیسون کدام مورد صحیح است؟

- (ا) بررسی علائم افزایش حجم مایع
- (ب) کنترل هیپوتانسیون در بیمار
- (ج) تشویق به بیشتر بیمار
- (د) تشویق به تحرک و فعالیت

۴۵. در مراقبت از بیمار مبتلا به پر کاری تیروئید کدام مورد توصیه می شود؟

- (ا) عدم تجویز سرم قندی
- (ب) تشویق بیمار به تحرک و فعالیت
- (ج) مصرف غذایی پر پروتئین و پر کالری
- (د) تشویق بیمار به مصرف مایعات گرم

۴۶. در مراقبت پرستاری پس از جراحی تیروئیدکتومی کدام مورد صحیح است؟

- (ا) استفاده از اکسیژن در ۲۴ ساعت اول
- (ب) مصرف ضد دردهای سیستمیک به طور منظم
- (ج) قرار دادن بیمار در پوزیشن صاف
- (د) خنک نگهداشت محیط و پوشیدن لباس سبک

۴۷. کدامیک از موارد زیر از عوارض درمان کتواسیدوز دیابتیک می باشد؟

- (ا) افزایش میزان سدیم خون ناشی از خون رسانی ناکافی بافتی
- (ب) افزایش بار مایعات بدن ناشی از دریافت مایعات زیاد در مدت کم
- (ج) افزایش سدیم و پتاسیم خون ناشی از هیدراتاسیون
- (د) جابجایی پتاسیم از داخل به خارج سلول با مصرف انسولین

۴۸. در مراقبت از پای دیابتیک چه مواردی باید آموزش داده شود؟

- (ا) استفاده از لوسيون بين انگشتان پا
- (ب) مصرف پمادهای گیاهی در صورت زخم
- (ج) پوشیدن متناسب کفش های نو
- (د) پوشیدن کفش های جلو باز

۴۹. کدامیک از تغییرات آب و الکترولیت زیر در در صدمات اولیه ناشی از سوختگی ایجاد می شود؟

- (ا) هیپوناترمی
- (ب) هیپوکالمی
- (ج) هیپرناترمی
- (د) هیپرکلسما

۵۰. برای مراقبت از بیمار سوء تغذیه ای که قرار است به زودی جراحی شود رژیم مناسب کدام است؟

- (ا) پر پروتئین و کم کربوهیدرات برای کمک به بهبود زخم

(ب) پر پروتئین و پر کربوهیدرات برای کمک به بهبود زخم

(ج) پر پروتئین و پر ویتامین برای کمک به طولانی شدن زمان انعقاد

(د) پر پروتئین با حجم زیاد مایعات برای جلوگیری از دزهیدراتاسیون ناشی از خونریزی

## پرستاری بهداشت جامعه

۵۱. کدام گزینه جزء اصول بهداشت برای همه می باشد؟

- (ا) آموزش بهداشت
- (ب) ایمن سازی
- (ج) فناوری مناسب
- (د) بهسازی محیط

۵۲. ساکنین یک شهر ضمن ارائه راه حل برای رفع مشکل جمع آوری زباله، با شهرداری همکاری نموده و بر نحوه اجرای آن نظارت دارند. کدام اصل مراقبت های اولیه بهداشتی استقرار یافته است؟

- (ا) هماهنگی بین بخشی
- (ب) برابری توزیع
- (ج) خدمات بهداشتی اساسی
- (د) مشارکت جامعه

- ۵۳. پیشگیری از بیماری عروق کرونر از طریق اصلاح شیوه زندگی (ورزش روزانه، تنفس سالم، عدم استعمال دخانیات) صورت می گیرد. این امر بر پایه کدام مدل است؟**
- (ب) شبکه علیت
  - (د) زیست شناختی
  - (ج) ملت همه گیری شناختی
  - (الف) اکولوژیک
- ۵۴. اولویت بندی اصلاح رفتارها برای پیشگیری از دیابت بر اساس کدام فرضیه است؟**
- (ب) همه گیر شناختی
  - (د) اجتماعی
  - (الف) میکروبی
  - (ج) چند عاملی
- ۵۵. دوره ای که عامل بیماریزا بدون بروز علائم آشکار در بدن میزان تکثیر می یابد کدام است؟**
- (ب) تحت حاد
  - (د) بالینی
  - (الف) مقدماتی
  - (ج) پنهانی
- ۵۶. نشانگر حساس برای دسترسي، میزان استفاده و کارایی خدمات بهداشتی به ویژه مراقبت های دوران بارداری کدام است؟**
- (ب) میرایی شیرخواران زیر یکسال
  - (د) میرایی نوزادان زیر ۲۸ روز
  - (الف) میرایی کودکان زیر ۵ سال
  - (ج) امید به زندگی در بد و تولد
- ۵۷. افزایش کدامیک از موارد زیر منجر به افزایش میزان شیوع می شود؟**
- (ب) موارد فوت شده
  - (د) جمعیت پایه
  - (الف) موارد بهبود یافته
  - (ج) موارد ابتلای جدید
- ۵۸. وجود پایدار عامل بیماریزا در یک منطقه جغرافیایی یا گروه جمعیتی کدام حالت است؟**
- (ب) آندمیک
  - (د) پاندمیک
  - (الف) اپیدمیک
  - (ج) اسپورادیک
- ۵۹. ریز قطرات عفونی ناشی از عطسه تا چه فاصله ای می تواند انتشار یابد؟**
- (ب) بین ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر
  - (د) بیش از یک متر
  - (الف) تا ۳۰ سانتیمتر
  - (ج) تا یک متر
- ۶۰. برای کنترل بیماری مالاریا، کدام رویکرد اثرگذارتر است؟**
- (ب) بوم شناسی انسانی
  - (د) مبارزه با ناقلین
  - (الف) درمان بیماران
  - (ج) بهسازی محیط فیزیکی
- ۶۱. در کدام گزینه از بین بردن مخزن عفونت مطلوب ترین تدبیر است؟**
- (ب) پولیومیلیت
  - (د) قب مالت
  - (الف) سل انسانی
  - (ج) سرخک
- ۶۲. عبارت زیر تعریف کدام گزینه است؟**
- نظارت مداوم بر همه جنبه های بروز و انتشار بیماریها که برای مبارزه کارساز مناسب است
- (الف) مبارزه با بیماری ها
  - (ج) مراقبت از بیماری ها
  - (ب) بیماریابی
  - (د) قرنطینه
- ۶۳. اندازه گیری های انسان سنجی در سن پیش دبستانی شامل کدام نشانگر وضعیت بهداشت است؟**
- (ب) زیست محیطی
  - (د) وضعیت تنفسی
  - (الف) اجرای خدمات بهداشتی
  - (ج) کیفیت زندگی
- ۶۴. هدف از ایمن سازی ایجاد کدام گزینه است؟**
- (ب) پاسخ ثانویه در برابر پادگن
  - (د) ایمنی یاخته ای
  - (الف) پاسخ اولیه در برابر پادگن
  - (ج) حافظه ایمنی شناختی

۶۵. برنامه بسیج ریشه کنی فلچ اطفال بر افزایش کدام مورد متکی بود؟  
 ب) جمعیت حساس  
 د) ایمنی فعال  
 الف) ایمنی جامعه  
 ج) احتمال انتقال بیماری
۶۶. چنانچه طی دو هفته پس از تلقیح واکسن های زنده ویروسی (بجز پولیو خوراکی و تب زرد) به هر علت گاماگلوبولین وریدی تزریق شود کدام اقدام صورت می گیرد؟  
 ب) تکرار واکسن پس از ۴ ماه  
 د) عدم تکرار واکسن  
 الف) تکرار واکسن پس از ۴ ماه  
 ج) تکرار واکسن پس از ۳ ماه
۶۷. برنامه واکسیناسیون هاری برای فردی که مورد تهاجم یک سگ با نتیجه آزمایش هاری منفی قرار گرفته، کدام است؟  
 ب) ۵ نوبت - روزهای صفر، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵  
 ج) ۳ نوبت - روزهای صفر، ۳ و ۷  
 د) ۲ نوبت - روزهای صفر و ۷  
 الف) ۶ نوبت - روزهای صفر، ۳، ۷، ۱۴ و ۲۰
۶۸. شروع برنامه ایمن سازی کودکان نارس (کمتر از ۳۷ هفته) با وزن بیش از ۲۰۰۰ گرم کدام است؟  
 ب) ۱۰ روز پس از تولد  
 د) یک ماه پس از تولد  
 الف) روال عادی  
 ج) ۱۵ روز پس از تولد  
 ب) ۴  
 د) ۶  
 الف) ۳  
 ج) ۵
۶۹. بعد از پایان چند سالگی تزریق واکسن سه گانه ممنوع است و باید از واکسن دو گانه ویژه بزرگسالان استفاده شود؟  
 الف) ۳
۷۰. کدام گزینه جامع تر و دربرگیرنده بقیه موارد است؟  
 ب) دانش فرهنگی  
 د) مهارت فرهنگی  
 الف) حساسیت فرهنگی  
 ج) شایستگی فرهنگی
۷۱. در اجرای برنامه های غربالگری کدام اهمیت بیشتری دارد؟  
 ب) رضایت مراجعین طرح  
 د) به کارگیری رابطین بهداشتی  
 الف) انتشار نتایج برنامه  
 ج) فراهم نمودن امکان درمان و ارجاع
۷۲. اقدام ضروری در پیشگیری سطح اول برای انتقال عفونت **HIV** در معتادان کدام است؟  
 ب) درمان دارویی  
 د) جداسازی و درمان  
 الف) غربالگری  
 ج) توزیع سرنگ استریل
۷۳. محتواهای یک برنامه آموزش بهداشت منطبق بر دانش علمی، فرهنگ عمومی و اهداف اجتماعی می باشد. کدام اصل آموزش بهداشت رعایت شده است؟  
 ب) قابل قبول بودن  
 د) یادگیری از طریق عمل  
 الف) جامعیت  
 ج) از دانسته به ندانسته
۷۴. هدف اصلی تریاژ هنگام بلایا کدام است؟  
 ب) برآورد منابع مورد نیاز برای مراقبت  
 د) تفکیک افراد به قابل درمان و غیرقابل درمان  
 الف) دسته بندی بیماران از جهت اولویت  
 ج) نجات تعداد بیشتری از بازماندگان
۷۵. هنگام بلایا، دو ملاک اصلی برای تعیین افرادی که به درمان بلاذرنگ نیاز دارند، کدام است؟  
 ب) سن افراد - منابع موجود  
 د) دستورالعمل ها - جنس افراد  
 الف) احتمال زنده ماندن - منابع موجود  
 ج) میزان آسیب - عوارض احتمالی
۷۶. عامل اصلی ایجاد بحران در خانواده کدام است؟  
 ب) کیفیت روابط  
 د) شدت استرس  
 الف) ناتوانی در سازگاری  
 ج) منابع ناکافی

- ۷۷.** علت اصلی غفلت فیزیکی از کودک کدام است؟
- (ب) کم سوادی
  - (د) مشغله زیاد
  - (الف) فقر زیاد
  - (ج) سن پائین
- ۷۸.** مداخله مستقیم برای پیشگیری از کم وزنی هنگام تولد کدام است؟
- (ب) توصیه به پرهیز از کار سنگین
  - (د) مبارزه با عفونت دوران بارداری
  - (الف) اجرای برنامه تنظیم خانواده
  - (ج) توصیه به پرهیز از مصرف سیگار
- ۷۹.** مهمترین عامل زیست شناختی تعیین کننده میرایی شیرخواران کدام است؟
- (ب) وزن هنگام تولد
  - (د) تغذیه با شیر مادر
  - (الف) ازدواج زودرس
  - (ج) مرتبه زایمان
- ۸۰.** منظور از الگوهای تعامل تکرار شونده و قابل پیش بینی در خانواده کدام مورد است؟
- (ب) ساختار نقش
  - (د) نظام ارزشی
  - (الف) فرایند خانواده
  - (ج) ساختار ارتباطات
- ۸۱.** کدام رویکرد بیشتر به تعاملات اعضا خانواده توجه دارد؟
- (ب) خانواده به عنوان زمینه
  - (د) خانواده به عنوان جزء جامعه
  - (الف) خانواده به عنوان سیستم
  - (ج) در کدام خانواده خشونت بیشتر روی می دهد؟
- ۸۲.** در منظور از الگوهای تعامل تکرار شونده و قابل پیش بینی در خانواده کدام مورد است؟
- (ب) ثروتمند
  - (د) تک فرزند
  - (الف) منزوی
  - (ج) میانسال
- ۸۳.** پرستار بهداشت خانواده در بررسی سلامت کودک متوجه شکستگی های متعدد درمان نشده می شود. احتمال بروز کدام گزینه مطرح است؟
- (ب) پوکی استخوان
  - (د) بیماری ژنتیک
  - (الف) کودک آزاری
  - (ج) غفلت
- ۸۴.** تأخیر در رشد کودک بیشتر در کدام خانواده است؟
- (ب) باز
  - (د) بسته
  - (الف) فقیر
  - (ج) منزوی
- ۸۵.** ارزیابی خطر و طراحی برنامه عملیاتی جهت تقلیل اثرات بلایا قابل پیش بینی در کدام مرحله بلایا انجام می شود؟
- |             |             |
|-------------|-------------|
| Pre Impact  | Impact      |
| Predictable | Post Impact |
- ۸۶.** مؤثر ترین عامل در واکنش روانشناختی به بلایا کدام است؟
- (ب) محدود بودن سیستم های حمایتی
  - (د) درک فرد از واقعه
  - (الف) دسترسی به خدمات امداد و نجات
  - (ج) نزدیکی به محل حادثه
- ۸۷.** اقدامی که در تریاژ اولیه ترومای روانشناختی مددجو را بهبود می بخشد کدام است؟
- (ب) نگهداری خانواده در کنار هم
  - (د) بررسی سطح استرس فرد
  - (الف) انجام کارهای مددجو
  - (ج) جدا کردن کودکان از والدین
- ۸۸.** پرستاران شاغل در بخش عفونی بیشتر در معرض کدام عوامل خطرزای ناشی از کار قرار دارند؟
- (ب) مکانیکی
  - (د) فیزیکی
  - (الف) شیمیایی
  - (ج) زیست شناختی
- ۸۹.** کدام روش پاستوریزه کردن شیر گرمای زیاد و مدت کوتاه نام دارد؟
- (ب) HTST
  - (الف) Holder

MBRT (د)

UHT (ج)

۹۰. از معایب هیدروژنه کردن روغنها کدام است؟

- (الف) کاهش ارزش اسیدهای چرب ضروری  
 (ب) افزایش قوام روغن هیدروژنه  
 (ج) کاهش ماندگاری در هوای گرم  
 (د) کاهش ماندگاری در هوای مرطوب

### پرستاری بهداشت روان و روان پرستاری

۹۱. ارائه خدمات مراقبت های بهداشت روانی در جامعه دارای اهداف زیر می باشد، بجز:

(الف) کاهش نیاز به بستری مددجو در بیمارستان

(ب) کمک به مددجو در کاهش اسقفلال شخصی

(ج) افزایش استفاده از خدمات بهداشت روانی در جامعه

(د) کمک به مددجو در ارتقا کیفیت زندگی

۹۲. مهمترین هدف بهداشت روان کدام است؟

(الف) حمایت از بیمار روانی

(ج) درمان اختلالات روانی

(ب) آموزش به بیماران روانی

(د) ارتقا سلامت روانی

۹۳. در پیشگیری سطح اول از اختلالات روانی کدامیک از موارد زیر انجام می گیرد؟

(الف) بررسی های اپیدمیولوژیک و اتیولوژیک

(ج) انجام توانبخشی سریع در بیمار

(ب) غربالگری بیماری

(د) درمان سریع اختلال روانی

۹۴. موققیت آمیز بودن مصاحبه در بررسی وضعیت روانی مددجو بیشتر به کدامیک از عوامل زیر بستگی دارد؟

(الف) صحیح انجام شدن فرایند مصاحبه

(ج) اعتماد و احترام میان پرستار و مددجو

(ب) داشتن اگاهی و دانش از بیماری ها

(د) آگاهی از مهارت های انجام مصاحبه

۹۵. توصیف زیر نشاندهنده وجود کدامیک از مکانیسم های دفاعی می باشد؟

(الف) عکس العمل سازی

(ج) برون فکنی

(ب) والايش

(د) همانندسازی

۹۶. کدامیک از تکنیک های درمانی بین فردی در جمله زیر میان پرستار و مددجو صورت گرفته است؟

پرستار: در مورد این مسئله چطوری احساس می کنی؟

(الف) تشویق به مقایسه

(ج) سئوال باز

(ب) بیان مجدد

(د) خلاصه نمودن

۹۷. بهترین روش مدیریت تعارض توسط روانپرستار کدام است؟

(الف) همکاری

(ج) تطابق

(ب) رقابت

(د) سازش

۹۸. کدام گزینه از تعاریف قاطعیت می باشد؟

(الف) تجاوز به حقوق دیگران

(ج) انتخاب فعالیت برای دیگران

(ب) هتك حرمت شدن توسط دیگران

(د) در نظر گرفتن حقوق دیگران

۹۹. کدامیک از تکنیک های غیردرمانی ارتباط بین فردی در جمله زیر میان پرستار و بیمار صورت نپذیرفته است؟

مددجو به پرستار: من در مورد این مسئله نگران هستم

پاسخ پرستار: جای نگرانی نیست، همه چیز حل خواهد شد.

(الف) بیان احساسات

(ج) توضیح دادن

(ب) اطمینان غلط دادن

(د) تعبیر و تفسیر کردن

- ۱۰۰. اقدام پرستاری در مورد مددجویی که هذیان دارد کدام است؟**
- الف) سئوال نمودن در مورد جزئیات هذیان
  - ب) منع نمودن مددجو در انجام فعالیت های گروهی و درمان ها
  - ج) تمکن بر احساس منتج از هذیان تا محتوای آن
  - د) بحث کردن با مددجو در مورد هذیان
- ۱۰۱. کدامیک از موارد زیر به پرستاران در برقراری ارتباط با سالمندان توصیه نمی گردد؟**
- (الف) اجازه ندادن حق انتخاب و تصمیم گیری
  - (ب) درگیر کردن سالمند در انجام فعالیت های روزانه
  - (ج) داشتن صبر و حوصله و نگرش غیرقضاوتی
  - (د) یادآوری خاطرات روزهای سپری شده
- ۱۰۲. در مصرف کدامیک از داروهای زیر نیاز به محدودیت غذایی و دارویی وجود دارد؟**
- (الف) TCAs
  - (ب) EPs
  - (ج) SSRIa
- ۱۰۳. کدامیک از مداخلات پرستاری در مواجهه با بیمار مضطرب از اقدامات اولیه می باشد؟**
- (الف) ماندن با مددجو و ایجاد حس امنیت در او
  - (ب) احساس همدردی و صحبت با مددجو
  - (ج) محول نمودن فعالیتی به مددجو
- ۱۰۴. از علائم ویژه وابستگی به مواد کدام است؟**
- (الف) قادر نبودن به انجام کارهای واگذار شده به شخص
  - (ب) بروز تغییرات روان شناختی در حین و یا بعد از استفاده
  - (ج) بروز نشانه ها و علائم ترک در صورت قطع دارو
  - (د) نشان دادن اختلالات شناختی و علائم تهاجمی
- ۱۰۵. در آموزش به خانواده بیماری که به افسردگی اساسی مبتلا بوده است و از بیمارستان ترخیص شده است ذکر نکات زیر ضروری است جز :**
- (الف) دادن مسئولیت به بیمار در انجام بعضی از کارهای خانه
  - (ب) آموزش در مورد تغذیه صحیح و ورزش
  - (ج) ایجاد تغییرات در زندگی بیمار در هنگام بهبودی افسردگی
  - (د) آموزش در مورد داروها و عوارض انها
- ۱۰۶. ثبات در تغییرات فیزیکی کدامیک از اختلالات مزمن زیر در سالمندان به مشکلات روحی ختم می شود؟**
- (الف) اضطراب
  - (ب) کاهش بینایی
  - (ج) اختلالات شبه جسمی
  - (د) دیابت
- ۱۰۷. اقدام پرستاری در مورد اطمینان از دریافت مایعات کافی توسط بیمار در هنگام تجویز کدام دارو اهمیت دارد؟**
- (الف) کربنات لیتیوم
  - (ب) لارگاکتیل
  - (ج) هالوبریدول
  - (د) ایندرال
- ۱۰۸. تجویز داروی Cogentin جهت پیشگیری از عوارض سوء داروهای آرام بخش می باشد؟**
- (الف) افزایش وزن
  - (ب) علائم پارکینسونیسم
  - (ج) تاری دید
  - (د) افزایش فشار خون
- ۱۰۹. نگرانی بیش از حد پیرامون حوادث گذشته و آینده، علائم شایع جسمی مانند سردرد و معده درد مربوط به کدامیک از اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانان می باشد؟**
- (الف) فوبیای خاص
  - (ب) اضطراب منتشره
  - (ج) اختلال هراس
  - (د) وسوس جبری
- ۱۱۰. کدامیک از داروهای زیر در جهت ثبات خلق و خوی به کار می رود؟**
- (الف) کلوzapین
  - (ب) سترالین
  - (ج) کاربامازپین
  - (د) لارگاکتیل

۱۱۱. هدف از مداخله بحران کدام است؟

- الف) راهنمایی و حل مشکل فرد
- ب) برگرداندن فرد به سطح قبل از بحران
- ج) کاهش افسردگی در فرد

۱۱۲. انجام موارد زیر در بررسی مددجو برای احتمال خطر خودکشی با اهمیت است به استثنای:

- ب) مشاهده ظاهر افسرده در مددجو
- ج) داشتن تاریخچه قبلی اقدام به خودکشی

(د) عدم ترس از کابوس های شبانه

۱۱۳. کدامیک از موارد زیر رفتار شاخص افسردگی در کودکان و نوجوانان است؟

- الف) اضطراب
- ب) هذیان
- ج) وسوس فکری
- د) تحريك پذیری

۱۱۴. خدمات زیر در پیشگیری سطح اول قرار دارد بجز:

- الف) کنترل چربی و فشار خون
- ب) مشاوره و آموزش
- ج) فیزیوتراپی و بازتوانی

(د) آموزش به مادران در مورد تربیت فرزندان

۱۱۵. طلاق در کدام دسته از بحران ها قرار می گیرد؟

- الف) رشدی
- ب) موقعیتی
- ج) داخلی
- (د) تکاملی

۱۱۶. پرهیز از ایجاد تغییرات ناگهانی، به آرامی و واضح صحبت کردن و ثابت نگهداشتن عادت های روزانه جزء مداخلات پرستاری کدام اختلالات زیر است؟

- الف) شناختی
- ب) وسوس
- ج) اضطراب
- (د) توهم

۱۱۷. مراقبت های پرستاری از بیمار مبتلا به اختلالات شناختی کدام است؟

- الف) صحبت نکردن با بیمار در مورد فعالیت های روزانه
- ب) عدم انجام فعالیت های تکراری
- ج) صحبت با دیگران در مورد بیمار در حضور وی
- (د) خاطره پردازی با بیمار در مورد خاطرات قدیمی

۱۱۸. اقدام پرستاری از مددجوی با اختلال شخصیت ضد اجتماعی کدام است؟

- الف) استثنا قائل نشدن در انجام برنامه ریزی های حین بستری
- ب) انعطاف پذیری به درخواست ها و تقاضای مددجو
- ج) اگاهی کامل ندادن به مددجو در مورد رفتارهای قابل انتظار

- (د) داشتن برنامه غیرساختار و سازمان یافته جهت فعالیت روزانه

۱۱۹. پرستار در آموزش به خانواده بیماران با اختلالات شناختی باید موارد زیر را تذکر دهد بجز:

- الف) کاهش محرك های محیطی
- ب) نشان دادن عکس های آشنا به بیمار
- ج) تأمین امنیت محیط
- (د) دادن داروهای گیاهی

۱۲۰. داشتن احساس گناه، یأس و نالمیدی، تحريك پذیری، گیجی و غمگینی جزء کدامیک از واکنش های شایع در فرایند

سوگ می باشد؟

- الف) عقلانی

ج) رفتاری

## پاسخنامه

| سوال | پاسخ                  | سوال | پاسخ                  | سوال | پاسخ                  |
|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|
| .۴۱  | گزینه (ب) صحیح است.   | .۲۱  | گزینه (ج) صحیح است.   | .۱   | گزینه (الف) صحیح است. |
| .۴۲  | گزینه (د) صحیح است.   | .۲۲  | گزینه (ج) صحیح است.   | .۲   | گزینه (د) صحیح است.   |
| .۴۳  | گزینه (الف) صحیح است. | .۲۳  | گزینه (د) صحیح است.   | .۳   | گزینه (ج) صحیح است.   |
| .۴۴  | گزینه (ب) صحیح است.   | .۲۴  | گزینه (ج) صحیح است.   | .۴   | گزینه (ب) صحیح است.   |
| .۴۵  | گزینه (ج) صحیح است.   | .۲۵  | گزینه (ب) صحیح است.   | .۵   | گزینه (الف) صحیح است. |
| .۴۶  | گزینه (د) صحیح است.   | .۲۶  | گزینه (ج) صحیح است.   | .۶   | گزینه (ج) صحیح است.   |
| .۴۷  | گزینه (ب) صحیح است.   | .۲۷  | گزینه (د) صحیح است.   | .۷   | گزینه (ج) صحیح است.   |
| .۴۸  | گزینه (ج) صحیح است.   | .۲۸  | گزینه (ب) صحیح است.   | .۸   | گزینه (ب) صحیح است.   |
| .۴۹  | گزینه (الف) صحیح است. | .۲۹  | گزینه (ب) صحیح است.   | .۹   | گزینه (ج) صحیح است.   |
| .۵۰  | گزینه (ب) صحیح است.   | .۳۰  | گزینه (ج) صحیح است.   | .۱۰  | گزینه (ج) صحیح است.   |
| .۵۱  | گزینه (الف) صحیح است. | .۳۱  | گزینه (د) صحیح است.   | .۱۱  | گزینه (د) صحیح است.   |
| .۵۲  | گزینه (الف) صحیح است. | .۳۲  | گزینه (ب) صحیح است.   | .۱۲  | گزینه (ب) صحیح است.   |
| .۵۳  | گزینه (ب) صحیح است.   | .۳۳  | گزینه (ج) صحیح است.   | .۱۳  | گزینه (ج) صحیح است.   |
| .۵۴  | گزینه (ج) صحیح است.   | .۳۴  | گزینه (ب) صحیح است.   | .۱۴  | گزینه (ب) صحیح است.   |
| .۵۵  | گزینه (ج) صحیح است.   | .۳۵  | گزینه (د) صحیح است.   | .۱۵  | گزینه (ج) صحیح است.   |
| .۵۶  | گزینه (ب) صحیح است.   | .۳۶  | گزینه (الف) صحیح است. | .۱۶  | گزینه (الف) صحیح است. |
| .۵۷  | گزینه (د) صحیح است.   | .۳۷  | گزینه (ب) صحیح است.   | .۱۷  | گزینه (ب) صحیح است.   |
| .۵۸  | گزینه (الف) صحیح است. | .۳۸  | گزینه (ج) صحیح است.   | .۱۸  | گزینه (ج) صحیح است.   |
| .۵۹  | گزینه (ب) صحیح است.   | .۳۹  | گزینه (الف) صحیح است. | .۱۹  | گزینه (الف) صحیح است. |
| .۶۰  | گزینه (ج) صحیح است.   | .۴۰  | گزینه (ب) صحیح است.   | .۲۰  | گزینه (ب) صحیح است.   |



| پاسخ                  | سوال | پاسخ                  | سوال | پاسخ                  | سوال |
|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| گزینه (الف) صحیح است. | .۱۰۱ | گزینه (ج) صحیح است.   | .۸۱  | گزینه (د) صحیح است.   | .۶۱  |
| گزینه (د) صحیح است.   | .۱۰۲ | گزینه (الف) صحیح است. | .۸۲  | گزینه (ج) صحیح است.   | .۶۲  |
| گزینه (الف) صحیح است. | .۱۰۳ | گزینه (الف) صحیح است. | .۸۳  | گزینه (د) صحیح است.   | .۶۳  |
| گزینه (ج) صحیح است.   | .۱۰۴ | گزینه (الف) صحیح است. | .۸۴  | گزینه (ج) صحیح است.   | .۶۴  |
| گزینه (ج) صحیح است.   | .۱۰۵ | گزینه (ب) صحیح است.   | .۸۵  | گزینه (الف) صحیح است. | .۶۵  |
| گزینه (د) صحیح است.   | .۱۰۶ | گزینه (د) صحیح است.   | .۸۶  | گزینه (الف) صحیح است. | .۶۶  |
| گزینه (الف) صحیح است. | .۱۰۷ | گزینه (ب) صحیح است.   | .۸۷  | گزینه (ج) صحیح است.   | .۶۷  |
| گزینه (ب) صحیح است.   | .۱۰۸ | گزینه (ج) صحیح است.   | .۸۸  | گزینه (الف) صحیح است. | .۶۸  |
| گزینه (ب) صحیح است.   | .۱۰۹ | گزینه (ب) صحیح است.   | .۸۹  | گزینه (د) صحیح است.   | .۶۹  |
| گزینه (ج) صحیح است.   | .۱۱۰ | گزینه (الف) صحیح است. | .۹۰  | گزینه (ج) صحیح است.   | .۷۰  |
| گزینه (ب) صحیح است.   | .۱۱۱ | گزینه (ب) صحیح است.   | .۹۱  | گزینه (ج) صحیح است.   | .۷۱  |
| گزینه (د) صحیح است.   | .۱۱۲ | گزینه (د) صحیح است.   | .۹۲  | گزینه (ج) صحیح است.   | .۷۲  |
| گزینه (د) صحیح است.   | .۱۱۳ | گزینه (الف) صحیح است. | .۹۳  | گزینه (ب) صحیح است.   | .۷۳  |
| گزینه (ج) صحیح است.   | .۱۱۴ | گزینه (ج) صحیح است.   | .۹۴  | گزینه (ج) صحیح است.   | .۷۴  |
| گزینه (ب) صحیح است.   | .۱۱۵ | گزینه (ب) صحیح است.   | .۹۵  | گزینه (الف) صحیح است. | .۷۵  |
| گزینه (الف) صحیح است. | .۱۱۶ | گزینه (ج) صحیح است.   | .۹۶  | گزینه (الف) صحیح است. | .۷۶  |
| گزینه (د) صحیح است.   | .۱۱۷ | گزینه (الف) صحیح است. | .۹۷  | گزینه (الف) صحیح است. | .۷۷  |
| گزینه (الف) صحیح است. | .۱۱۸ | گزینه (د) صحیح است.   | .۹۸  | گزینه (د) صحیح است.   | .۷۸  |
| گزینه (د) صحیح است.   | .۱۱۹ | گزینه (ب) صحیح است.   | .۹۹  | گزینه (ب) صحیح است.   | .۷۹  |
| گزینه (ب) صحیح است.   | .۱۲۰ | گزینه (ج) صحیح است.   | .۱۰۰ | گزینه (الف) صحیح است. | .۸۰  |

